

Số: /TB-CCTS

Cà Mau, ngày tháng năm 2025

THÔNG BÁO

Kết quả quan trắc môi trường nước phục vụ cho nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau (đợt 22) năm 2025

Nhằm cung cấp thông tin kịp thời cho người nuôi trồng thủy sản để chủ động trong sản xuất, Chi cục Thủy sản Cà Mau đã tiến hành lấy mẫu và phân tích chất lượng nước tại các tuyến sông đầu nguồn phục vụ nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh (đợt 22). Cụ thể như sau:

1. Thời gian và địa điểm lấy mẫu

1.1. Thời gian: ngày 28/11/2025.

1.2. Địa điểm: tại 27 điểm đầu nguồn thuộc các xã/phường trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Vị trí quan trắc bao gồm: sông Tắc Vân – phường Tân Thành, sông Hòa Tân – phường Hòa Thành, sông Định Bình – phường Hòa Thành, sông Gành Hào – xã Tân Thuận, sông Bà Bèo – xã Đàm Dơi, sông Đàm Dơi – xã Đàm Dơi, sông Bảy Háp – xã Cái Nước, sông Rạch Rập – xã Lương Thế Trân, sông Cái Nước – xã Cái Nước, sông Vàm Xáng – xã Phú Mỹ, sông Cái Bát – xã Nguyễn Việt Khái, sông Gò Công – xã Cái Đôi vàm, sông Cửa Lớn – xã Đất Mới, sông Cái Ngay – xã Năm Căn, sông Cửa Lớn – xã Năm Căn, sông Nhưng Miên – xã Phan Ngọc Hiền, sông Rạch Tàu – xã Đất Mũi, sông Rạch Gốc – xã Phan Ngọc Hiền, sông Tắc Thủ – xã Hồ Thị Kỷ, sông Trẹm – xã Biển Bạch, sông Chắc Băng – xã Thới Bình, sông Vàm Cái Tàu – xã Khánh An, sông Cái Tàu – xã Nguyễn Phích, kênh Hội – xã Khánh Lâm, sông Bà Kẹo – xã Sông Đốc, sông Ông Đốc – xã Trần Văn Thời, sông Ông Đốc – xã Sông Đốc.

2. Kết quả đo đạc và phân tích

2.1. Chỉ tiêu đo tại hiện trường

- **Nhiệt độ:** nhiệt độ tại các điểm quan trắc dao động từ 26 – 29°C, thích hợp cho thủy sản nuôi phát triển.

- **pH:** đa phần các điểm quan trắc có pH dao động từ 7,5 – 8 thích hợp cho thủy sản nuôi phát triển. Tuy nhiên, một số điểm quan trắc tại: sông Rạch Tàu, sông Vàm Cái Tàu, sông Cái Tàu, kênh Hội, sông Tắc Thủ, sông Trẹm và sông Chắc Băng có pH từ 6 – 7,4 không thích hợp cho thủy sản nuôi phát triển.

- **Oxy hòa tan (DO):** một số điểm quan trắc như: sông Bà Kẹo, sông Ông Đốc (xã Trần Văn Thời) và sông Ông Đốc (xã Sông Đốc) có DO bằng 5 mg/l, thích hợp cho thủy sản nuôi phát triển. Tuy nhiên các điểm quan trắc còn lại có giá trị DO từ 2,5 – 4 mg/l, không thích hợp cho thủy sản nuôi phát triển.

- **Độ mặn:** một số điểm quan trắc có độ mặn dao động từ 7 – 22‰, thích hợp cho thủy sản nuôi phát triển. Tuy nhiên, các điểm quan trắc tại: sông Rạch Rập, sông Vàm Cái Tàu, sông Cái Tàu, kênh Hội, sông Tắc Thủ, sông Trẹm và sông Chắc Bàng có độ mặn dao động từ 0 – 6‰, không thích hợp cho thủy sản nuôi phát triển.

- **Độ trong:** đa phần các điểm quan trắc có độ trong dao động từ 30 – 45 cm, thích hợp cho thủy sản nuôi phát triển. Tuy nhiên, các điểm quan trắc tại: sông Bảy Háp, sông Cái Bát, sông Gò công, sông Vàm Cái Tàu và sông Tắc Thủ có độ trong bằng 25 cm, không thích hợp cho thủy sản nuôi phát triển.

2.2. Chỉ tiêu phân tích tại phòng thí nghiệm

- **Độ kiềm:** các điểm quan trắc có độ kiềm dao động từ 95 – 122,5 mgCaCO₃/l, thích hợp cho thủy sản nuôi phát triển.

- **Nitrite (NO₂⁻):** các điểm quan trắc có hàm lượng Nitrite từ không phát hiện đến 0,31 mg/l, thích hợp cho thủy sản nuôi phát triển.

- **Nitrate (NO₃⁻):** các điểm quan trắc có hàm lượng Nitrate từ 0,66 – 1,12 mg/l, thích hợp cho thủy sản nuôi phát triển.

- **Amoni (NH₄⁺):** các điểm quan trắc có hàm lượng Amoni từ không phát hiện đến 0,26 mg/l, thích hợp cho thủy sản nuôi phát triển.

- **Phosphate (PO₄³⁻):** một số điểm quan trắc có hàm lượng Phosphate từ không phát hiện đến 0,14 mg/l, thích hợp cho thủy sản nuôi phát triển. Tuy nhiên, các điểm quan trắc như: sông Bảy Háp, sông Rạch Rập, sông Cái Nước, sông Vàm Xáng, sông Cái Bát và sông Gò Công có hàm lượng Phosphate từ 0,17 – 0,2 mg/l, không thích hợp cho thủy sản nuôi phát triển.

- **Nhu cầu Oxy hóa học (COD):** một số điểm quan trắc có hàm lượng COD dao động từ 14 – 20 mg/l, thích hợp cho thủy sản nuôi phát triển. Tuy nhiên, một số điểm quan trắc: sông Tắc Vân, sông Hòa Tân, sông Rạch Rập, sông Cái Nước, sông Vàm Xáng, sông Cửa Lớn (xã Đất Mới), sông Cửa Lớn (xã Năm Căn), sông Nhưng Miên, sông Rạch Gốc, sông Chắc Bàng, sông Bà Kẹo và sông Ông Đốc (xã Trần Văn Thời) có hàm lượng COD từ 21 – 29 mg/l, không thích hợp cho thủy sản nuôi phát triển.

- **Vibrio spp (tổng số):** hầu hết các điểm quan trắc có mật độ *Vibrio spp* tổng số từ <10 đến 9,7 x10² CFU/ml, không ảnh hưởng đến thủy sản nuôi phát triển. Tuy nhiên, một số điểm quan trắc: sông Tắc Vân, sông Định Bình, sông Bà Bèo, sông Đầm Dơi, sông Cửa Lớn (xã Đất Mới), sông Cái Ngay, sông Cửa Lớn (xã Năm Căn), sông Nhưng Miên, sông Rạch Tàu và sông Rạch Gốc có mật độ *Vibrio spp* tổng số 1,4 x10³ - 1,2 x10⁴ CFU/ml, không thích hợp cho thủy sản nuôi phát triển.

- **Vibrio parahaemolyticus:** các điểm quan trắc có mật độ *Vibrio parahaemolyticus* từ <10 đến 3,6x10¹ CFU/ml, thích hợp cho thủy sản nuôi phát triển.

3. Đánh giá chung

Nhìn chung, qua kết quả đo đạc và phân tích các chỉ tiêu môi trường nước phục vụ nuôi trồng thủy sản như: nhiệt độ, NO_2^- , NO_3^- , NH_4^+ , vi sinh *Vibrio spp* (tổng số), vi sinh *Vibrio parahaemolyticus* cho thấy chất lượng nước vào thời điểm quan trắc đều đạt yêu cầu, nằm trong giới hạn thích hợp cho sự sinh trưởng và phát triển của thủy sản nuôi. Tuy nhiên, vẫn còn một số chỉ tiêu như: pH, DO, độ mặn, độ trong, độ kiềm, PO_4^{3-} , và COD tại một số điểm quan trắc vượt ngưỡng cho phép không thích hợp cho thủy sản nuôi phát triển.

4. Khuyến cáo

Theo kết quả quan trắc lượng mưa tại các trạm đo mưa tự động trên địa bàn tỉnh Cà Mau của Trung tâm Kỹ thuật – Công nghệ – Quan trắc trong tháng 11/2025: ghi nhận mưa xuất hiện nhiều, không đồng đều trong tháng, chủ yếu là mưa lớn ở một số khu vực nhất định, một số nơi mưa vừa và mưa nhỏ. Tổng lượng mưa tháng 11/2025 ghi nhận tại các trạm dao động từ 70,2 mm (Trạm Năm Căn) đến 393,8 mm (Trạm Thanh Tùng). Trong tháng 11/2025 ghi nhận 28/35 trạm có lượng mưa cao hơn so với cùng kỳ năm 2024. Xu thế chung là lượng mưa tăng nhiều cả về tổng lượng mưa, tần suất và cường độ.

Ngoài ra theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia trong ngày và đêm 11/12, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 – 7. Bên cạnh đó, theo ghi nhận vùng biển Nam Bộ đang trong thời kỳ triều cường cao có xu hướng giảm, ngày 15/12 triều cường tăng trở lại; ngoài ra không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro cho thủy sản nuôi. Để đề phòng các tình huống thời tiết, triều cường gây bất lợi, Chi cục Thủy sản khuyến cáo đến người nuôi trồng thủy sản một số biện pháp chăm sóc tôm nuôi để phòng tránh thiệt hại trong sản xuất:

- Cần gia cố bờ bao, cống để tránh mưa to làm sạt lở, nước tràn bờ bao làm thủy sản thất thoát.

- Nên tháo bỏ lớp nước mặt trong và sau khi mưa, đồng thời tăng cường quạt nước để tránh hiện tượng phân tầng nước.

- Dùng vôi nông nghiệp, hoặc vôi sống tạt trên bờ trước khi mưa, sau khi mưa hòa vôi trong nước tạt đều quanh ao/vuông nuôi để ổn định pH.

- Chủ động giảm hoặc ngưng cho tôm ăn trong thời gian có mưa vì khi mưa tôm nuôi dễ bị sốc môi trường và giảm khả năng bắt mồi.

- Thường xuyên kiểm tra sức khỏe thủy sản nuôi và các yếu tố thủy lý, hóa trong ao/vuông và biểu hiện hoạt động của thủy sản nuôi, để kịp thời phát hiện diễn biến mầm bệnh, nhất là vào những ngày mưa to. Duy trì pH ở mức thích hợp 7,5 – 8,5 và dao động giữa sáng và chiều không quá 0,5 đơn vị.

- Định kỳ vệ sinh (siphon) đáy ao nuôi để loại bỏ bùn lắng và thức ăn dư thừa, giúp ổn định môi trường, hạn chế khí độc trong ao/vuông nuôi. Ngoài ra, định kỳ bổ sung men tiêu hóa, vi lượng, khoáng chất, vitamin,... đặc biệt là vitamin C vào khẩu phần ăn hằng ngày để tăng sức đề kháng cho thủy sản (tôm) nuôi.

- Cần lắng, lọc, diệt khuẩn và xử lý nước trước khi lấy vào ao/vuông nuôi; nên chủ động nguồn nước sạch và có nơi trữ nước để cung cấp, thay nước cho ao/vuông nuôi khi cần thiết; hạn chế trao đổi nước trực tiếp với môi trường bên ngoài sông, rạch khi chưa qua xử lý.

- Hộ nuôi lưu ý tránh thả nuôi mới trong thời gian có các chỉ tiêu vượt ngưỡng cho phép.

- Ngoài ra, hộ nuôi nên thường xuyên theo dõi các thông báo, khuyến cáo tại địa phương và các tin tức trên báo, đài và các trang thông tin điện tử để nắm bắt thông tin và có biện pháp ứng phó kịp thời.

Trên đây là thông báo, khuyến cáo của Chi cục Thủy sản Cà Mau đến người nuôi trồng thủy sản để chủ động trong sản xuất, nhằm hạn chế thiệt hại đối với thủy sản nuôi./.

Nơi nhận:

- Sở Nông nghiệp và Môi trường (b/c);
- Cục Thủy sản và Kiểm ngư (b/c);
- Trung tâm Khuyến nông (t/h);
- UBND các xã/phường (t/h);
- Ban biên tập Website Sở (t/h);
- Lưu: VT, NTTS_(Giang).

**KT. CHI CỤC TRƯỞNG
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG**

Nguyễn Văn Trung