

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ LAM SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Lam Sơn, ngày tháng 8 năm 2025

V/v hướng dẫn chăm sóc nuôi dưỡng và phòng, chống dịch bệnh cho vật nuôi sau mưa, bão.

Kính gửi:

- Trưởng các thôn, khu phố trên địa bàn xã Lam Sơn;
- Các hộ chăn nuôi trên địa bàn toàn xã Lam Sơn

Theo Hướng dẫn số 11/HD-TTĐVNN ngày 27/8/2025 của Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp Thọ Xuân về việc hướng dẫn chăm sóc nuôi dưỡng và phòng, chống dịch bệnh cho vật nuôi sau mưa, bão. Để chủ động phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, xử lý môi trường sau mưa bão, UBND xã Lam Sơn hướng dẫn một số biện pháp chăm sóc nuôi dưỡng, phòng, chống dịch bệnh như sau:

I. ĐỐI VỚI ĐÀN GIA SÚC, GIA CẦM

1. Vệ sinh chuồng trại và môi trường

Sau mưa bão lũ, nước rút quét dọn, vệ sinh chuồng trại, thu gom rác thải,... phun khử trùng, tiêu độc bằng hóa chất sát trùng, vôi bột để tiêu diệt mầm bệnh trong nền chuồng và xung quanh khu vực chăn nuôi. Định kỳ 1-2 lần/tuần phun thuốc sát trùng hoặc rắc vôi bột để vệ sinh môi trường khu vực chuồng trại.

- Vệ sinh máng ăn, máng uống, cọ rửa dụng cụ chăn nuôi, nền chuồng bằng xà phòng, phun tiêu độc khử trùng bằng hóa chất,... thu gom xác động vật chết để xử lý, chôn lấp ở những khu đất cao, trước khi chôn lấp, dùng vôi bột rắc hoặc thuốc sát trùng phun đều trên bề mặt xác động vật; đối với chuồng trại, những nơi tiêu hủy gia súc, gia cầm,... cần để trống chuồng ít nhất 2 tuần trở lên trước khi nuôi lứa mới, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ xảy ra dịch bệnh.

2. Chăm sóc nuôi dưỡng, tăng sức đề kháng cho vật nuôi.

- Tăng cường chăm sóc, nuôi dưỡng cho đàn gia súc, gia cầm, đảm bảo cung cấp đầy đủ thức ăn dễ tiêu, chất lượng phù hợp với từng lứa tuổi của vật nuôi để tăng sức khỏe, tăng sức đề kháng, tăng khả năng chống chịu với các tác động bất lợi của thời tiết, dịch bệnh là rất cần thiết. Khi cho gia súc gia cầm ăn chú ý kiểm tra kỹ, khi phát hiện thức ăn bị nhiễm nấm mốc, mùi vị không bình thường cần loại bỏ ngay, tuyệt đối không cho vật nuôi ăn. Đối với lợn con và gà con ở giai đoạn úm nên sử dụng thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh để đảm bảo đủ dinh dưỡng. Cung cấp đủ nước uống sạch, bổ sung thêm vitamin, khoáng chất, men tiêu hóa để nâng cao sức đề kháng cho vật nuôi.

- Đảm bảo nguồn thức ăn: Sau mưa lũ, nguồn thức ăn thô khan hiếm, cần tăng thêm lượng thức ăn tinh bột; đối với vật nuôi đang mang thai, nuôi con, gia súc non, bò sữa cần bổ sung vào thức ăn các loại khoáng chất, muối khoáng,

vitamin, chất điện giải để nâng cao sức đề kháng; đồng thời cho trâu bò ăn thêm ánh đa liêm, ngô dày, trồng cỏ để tạo nguồn thức ăn.

4. Xử lý và phòng bệnh cho vật nuôi

Sau mưa bão, trong điều kiện thời tiết nóng ẩm là điều kiện thuận lợi cho các loại dịch bệnh phát triển. Để quản lý dịch bệnh cho vật nuôi trong mùa mưa bão, người chăn nuôi cần chuẩn bị chuồng trại kiên cố, đảm bảo thoát nước, chủ động phòng bệnh bằng cách tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin cho vật nuôi trước mùa mưa bão theo qui định, cụ thể như sau:

+ Đối với trâu, bò: Cần tiêm phòng bệnh Tụ huyết trùng, Lở mồm long móng, Viêm da nổi cục.

+ Đối với lợn: Cần tiêm phòng Dịch tả lợn, Tụ huyết trùng, Phô thương hàn, Lở mồm long móng, Tai xanh...

+ Đối với gia cầm: Cần tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin Cúm gia cầm, Niu cát xonVịt, ngan cần tiêm phòng dịch tả vịt, cúm gia cầm, tụ huyết trùng...

- Vệ sinh phòng bệnh: Thường xuyên quét dọn, vệ sinh máng ăn, máng uống, các dụng cụ chăn nuôi trong và ngoài khu vực chuồng nuôi; Định kỳ mỗi tuần cho uống thêm B.complex để tăng khả năng tiêu hoá và sức đề kháng.

- Nếu thời tiết có các thay đổi bất thường kéo dài, có thể sử dụng thêm 1 số kháng sinh (Enrofloxacin, Oxytetracyclin...) cho gia cầm uống để phòng phát sinh các bệnh tiêu hóa và hô hấp.

- Thường xuyên kiểm tra đàn gia súc, gia cầm, đặc biệt phát hiện sớm những biểu hiện bất thường trên đàn vật nuôi như uể oải, ủ rũ, kém ăn,...Cách ly kịp thời, chẩn đoán và điều trị; khi có gia súc, gia cầm ốm, chết phải đào hố, chôn sâu và rắc vôi bột, tuyệt đối không giết mổ, vận chuyển, bán chạy, vứt xác động vật chết bừa bãi ra môi trường; chấp hành nghiêm túc công tác phòng, chống dịch bệnh theo qui định pháp luật thú y.

II. ĐỐI VỚI THỦY SẢN.

1. Vệ sinh môi trường ao nuôi

- Tiến hành dọn vệ sinh các tạp chất, tiêu hủy xác sinh vật ở xung quanh ao nuôi và vùng nuôi, thực hiện vệ sinh, tiêu độc khử trùng bằng vôi bột 2-3 kg/100 m³ hoặc các chế phẩm sinh học để hạn chế mầm bệnh trong ao. Duy trì mức nước ao từ 1,5-2 m, thả bèo để làm chỗ trú ẩn; vớt bỏ thức ăn dư thừa, tránh ô nhiễm ao nuôi; quản lý tốt các yếu tố môi trường ao nuôi, đặc biệt duy trì và ổn định độ pH từ 7,5-8,0; tăng cường chăm sóc, nuôi dưỡng nâng cao sức đề kháng.

- Khi mưa lớn kéo dài nước ao nuôi bị đục, pH bị giảm đột ngột nên rải vôi xung quanh bờ ao (liều lượng 10 kg/100 m²), kết hợp bón vôi xuống ao để ổn định PH nước và làm giảm độ đục của nước, lượng vôi 0,7 - 1 kg/100 m³ nước. Đồng thời giảm 30-50% lượng thức ăn cho cá.

2. Chăm sóc nuôi dưỡng

+ Đối với những ao bị sạt lở hoặc tràn bờ: Bồi đắp những chỗ bị sạt lở, vờ

của bờ ao. Thực hiện tháo cạn nước, thu toàn bộ cá còn lại (nếu có) trong ao, bắt hết cá tạp, vệ sinh ao và vét bùn chỉ để lớp bùn dày 15-20 cm, sau đó dùng vôi bột để khử trùng ao nuôi với lượng 7-10 kg/100m², thực hiện phơi đáy ao trước khi cấp nước vào ao nuôi tối thiểu từ 5 -7 ngày, phục vụ cho nuôi mới.

+ Đối với các ao đang còn sản phẩm: Tăng cường chăm sóc, quản lý ao nuôi, kiểm tra thường xuyên các yếu tố môi trường, sức khỏe thủy sản nuôi để có các biện pháp xử lý kịp thời. Cần theo dõi tình hình thời tiết để điều tiết lượng thức ăn; sau mưa chấm dứt hoàn toàn mới cho thủy sản ăn trở lại với lượng 30-50% so lúc bình thường và tiếp tục nuôi dưỡng theo qui trình, sử dụng thức ăn công nghiệp, tổng hợp, thức ăn tinh đảm bảo chất lượng, đủ số lượng theo yêu cầu.

3. Xử lý môi trường và phòng bệnh:

Sau mưa lũ, cá thường dễ bị bệnh, Vì vậy, cần phòng bệnh cho thủy sản nuôi bằng cách cho cá ăn đầy đủ, tránh những thức ăn bị hư, thối, đồng thời bổ sung thêm vitamin C, chế phẩm sinh học, men tiêu hóa, khoáng vào thức ăn để tăng sức đề kháng cho cá; thực hiện tốt việc bổ sung và thay nước theo yêu cầu cụ thể của từng ao, định kỳ bón vôi bột 2-3 tuần/lần với lượng 2-3 kg/100m³ nước ao hoặc chế phẩm sinh học, hoá chất (có trong danh mục cho phép sử dụng tại Việt Nam) để xử lý môi trường và phòng trị bệnh.

Yêu cầu Trung tâm cung ứng dịch vụ công, Trưởng các thôn, khu phố, tăng cường thông tin, tuyên truyền hướng dẫn nông dân nắm bắt, thực hiện có hiệu quả theo hướng dẫn trên./.

Nơi nhận:

- Như trên (T/hiện);
- Chủ tịch, PCT UBND xã;
- TTCUĐVC (Tuyên truyền);
- Lưu: VT, KT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Đình Hảo