

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM
DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP THỌ XUÂN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : /HD-TTĐVNNTX
V/v hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh
trên cây lúa cuối vụ Thu Mùa 2025.

Thọ Xuân, ngày tháng 8 năm 2025

Kính gửi: Chủ tịch UBND các xã.

Hiện nay các trà lúa đang giai đoạn ôm đòng - trổ bông - vào chắc. Trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, nắng nóng kết hợp mưa xen kẽ, độ ẩm cao, thuận lợi cho các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại như: Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn, bệnh khô vằn, rầy các loại,... Để bảo vệ kết quả sản xuất, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp Thọ Xuân hướng dẫn các biện pháp cụ thể như sau:

1. Đối với rầy các loại: Hiện nay rầy lúa 6 (tuổi 2-3), xuất hiện chủ yếu trên giống Bắc Thơm 7, Bắc Thịnh; mật độ trung bình 25-30 con/m², nơi cao 130- 150 con/m², tại các khu đồng và thấp xã Thọ Lập (*Thuận Minh cũ*) và Thọ Long (*xã Nam Giang, Xuân Phong, Bắc Lương cũ*)... cần tích cực điều tra, theo dõi những vùng thường xảy ra cháy rầy từ các vụ trước, những ruộng đã bị nhiễm, trên các giống nhiễm, chủ động phòng trừ khi mật độ rầy từ 750 con/m² trở lên (15 con/khóm).

+ Trên diện tích lúa ôm đòng đến trổ: Sử dụng các loại thuốc có tính nội hấp, lưu dẫn như: Chess 50WG, Chattot 600WG, Confidor 70WG, Actara 25WG, Admire 50EC,...

+ Trên diện tích lúa đã trổ đến chắc xanh: Sử dụng các loại thuốc tiếp xúc như: Abasba 50EC, Bassa 50 EC, Elsin 10EC, Titan 600 WG, Nibas 50EC, Cheestar 50WG, Milan 10WP, Acidosin 50 WP (vua rầy),... khi phun thuốc nhất thiết phải rẽ hàng từ 0,8 - 1m, phun trực tiếp phần thân gốc lúa, nơi rầy cư trú, Sau phun 3 - 5 ngày kiểm tra lại, nếu rầy tiếp tục nở, mật độ còn cao cần phun lại lần 2.

2. Đối với bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn: Bệnh gây hại rải rác trên các khu đồng, đặc biệt trên các chân ruộng trũng, các giống nhiễm, tỷ lệ bệnh trung bình 5%, nơi cao 15%, cục bộ 25%. Cần phun trừ ngay khi bệnh mới xuất hiện, nhất là sau các đợt mưa giông, sử dụng một trong các loại thuốc: *Kasumin 2SL, Diboxylin 2SL, Bonny 4SC, Apolis 20WP*,... Pha và phun theo hướng dẫn bao bì thuốc; phun kép 2 lần (lần 2 cách lần 1 từ 3-5 ngày).

3. Đối với bệnh khô vằn: Chủ động phun trừ khi tỷ lệ bệnh 10% trở lên; giai đoạn lúa trổ 5% và sau trổ có thể phun kết hợp trừ bệnh khô vằn và bệnh đen lem lép hạt bằng một trong các loại thuốc: *Tilsuper 300EC, VK Lasstop 425SC, Mitop one 390SC, Nevo 330EC*, khi phun có thể kết hợp 0,2 kg kali trắng (K₂PO₄)/2 bình 16 lít/500m² để tăng hiệu quả phòng trừ.

Lưu ý: Những vùng có diện tích sản xuất lúa tập trung quy mô lớn theo hướng hàng hóa nên sử dụng dịch vụ thiết bị bay phun thuốc đồng bộ, nhằm giảm chi phí đầu tư và tăng hiệu quả phòng trừ dịch hại.

Đề nghị UBND các xã, chỉ đạo Đài truyền thanh tăng thời lượng phát thanh, thông tin kịp thời nội dung hướng dẫn; phân công cán bộ thường xuyên bám sát đồng ruộng, kiểm tra phát hiện chính xác đối tượng sâu bệnh gây hại cuối vụ, hướng dẫn nông dân phun trừ kịp thời, bảo vệ kết quả sản xuất vụ Thu mùa 2025./.

Nơi nhận:

- Như trên (T/hiện);
- Lãnh đạo sở NN&Môi trường (B/cáo);
- Chi cục Trồng trọt&BVTV (B/cáo);
- Lưu TTDVNNTX.

GIÁM ĐỐC

Bùi Thị Nga