

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
XÃ XUÂN HÒA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Vv hướng dẫn các biện pháp chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng vụ Chiêm Xuân 2026.

Xuân Hòa, ngày tháng năm 2026

Hiện nay, cây lúa đang giai đoạn bén rễ hồi xanh đến đẻ nhánh, các cây màu như ngô, lạc xuân đang giai đoạn cây con, rau đậu các loại gối lứa liên tục,... Trong điều kiện thời tiết nền nhiệt độ ẩm dần, sáng sớm có sương mù, xen kẽ mưa phùn, độ ẩm không khí cao, tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng sâu bệnh phát sinh, gây hại. Để chủ động chăm sóc, phát hiện sớm và phòng trừ sâu bệnh kịp thời, bảo vệ sản xuất vụ Chiêm Xuân 2026, UBND xã hướng dẫn cụ thể như sau:

**1. Phòng trừ sâu bệnh trên cây lúa**

**1.1. Đối với dòi đục nõn:** Xuất hiện sau các đợt mưa, gây hại rải rác trên tất cả các xứ đồng, đặc biệt trên diện tích lúa cấy sớm. Ấu trùng của ruồi (gọi là dòi) gây hại bằng cách di chuyển đến các chồi non, bào ăn các mô lá non tạo thành các vết trắng hoặc vàng nhạt, đục thủng lá, làm cây lúa còi cọc, đẻ nhánh ít, chậm phát triển.

Nên giữ mực nước (3 - 4 cm) trên ruộng thường xuyên 30 ngày sau cấy để hạn chế ruồi đẻ trứng và gây hại. Khi mật độ ruồi xuất hiện nhiều (5 – 10% số rãnh lúa bị hại), cần phun trừ bằng một trong các thuốc: Kola 600WG, Virtako 40WG, Monter 40EC,... phun vào sáng sớm hoặc chiều mát, pha và phun theo hướng dẫn trên bao bì.

**1.2. Đối với bọ trĩ:** Gây hại chủ yếu trên những chân ruộng cao, thiếu nước. Cả bọ trĩ trưởng thành và sâu non đều hút nhựa lá non làm cho lá có màu vàng đỏ, quăn, không hồi phục được, gây hại nặng làm cho cây lúa còi cọc, kém phát triển, năng suất giảm.

Giai đoạn sau cấy đến khi cây lúa đẻ nhánh rộ, thường xuyên giữ mực nước trên ruộng để hạn chế sự gây hại của bọ trĩ. Khi tỷ lệ hại 15% số dảnh (hoặc mật độ bọ trĩ trên 2.500 con/m<sup>2</sup>), phun trừ bằng một trong các thuốc: Tasiêu 1.9EC, Trebon 10EC, Neretox 95WP, Subatox 75EC, ... pha và phun theo hướng dẫn trên bao bì, phun ướt đều toàn bộ lá để đạt hiệu quả diệt trừ cao.

**1.3. Đối với bệnh vàng lá sinh lý:** Phát sinh trong điều kiện thời tiết thay đổi đột ngột, phân chuồng chưa hoại mục, đất không được phơi ải. Khi bệnh mới phát sinh, ngọn lá lúa biến vàng đến đỏ khô, cây lúa đẻ nhánh kém, rễ mới không phát sinh do đất thiếu ôxi gây yếm khí. Những diện tích bị vàng sinh lý: Ngừng bón đạm, thay nước trong ruộng, bón bổ sung 10 - 15 kg vôi bột + 10 - 15 kg

super lân Lâm Thao/1 sào 500 m<sup>2</sup>, kết hợp làm cỏ sục bùn để giải phóng khí độc trong đất, hoặc phun phân qua lá có hàm lượng lân cao như: A-H 503; K-H; Pennac P,...phun từ 2-3 lần, mỗi lần cách nhau 3-4 ngày. Khi cây lúa ra lá mới, chăm bón theo quy trình.

**1.4. Đối với bệnh đạo ôn:** Dự báo bệnh đạo ôn xuất hiện và gây hại từ trung tuần tháng 3 (gây hại trên lá), do đó bà con cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, tăng cường kiểm tra đồng ruộng, đặc biệt những diện tích lúa cấy sớm, trên các chân đất vằn thấp (thừa đạm), trên các giống nhiễm như TBR225, Q5, Nếp, ...phát hiện bệnh sớm và phòng trừ kịp thời khi bệnh mới xuất hiện, không để ảnh hưởng đến sinh trưởng và năng suất lúa .

**2. Cây ngô xuân:** Chăm sóc sớm, bón phân cân đối giúp cây ngô sinh trưởng phát triển tốt, cho năng suất cao.

- Bón thúc đợt 1 (Khi ngô 3- 5 lá): 6- 7 kg ure + 3- 4 kg kali hoặc bón 15kg NPK chuyên thúc cây ngô (Tiền Nông). Bón cách gốc 5-7 cm, kết hợp xới xáo, vun gốc, lấp phân.

- Bón thúc đợt 2 (Khi ngô 7- 9 lá): 7- 8 kg ure + 4 kg kali hoặc bón 17 kg NPK chuyên thúc cây ngô (Tiền Nông). Bón cách gốc 7-10 cm, kết hợp vun cao gốc để tạo thế chống đổ cho cây.

- Bón thúc lần 3 (Khi ngô xoắn nõn): Tạo điều kiện cho ngô phát triển bấp to đều, hạt mẩy, chủ yếu sử dụng kali: 3- 4 kg kali + 1-2 kg ure.

- Phòng trừ bệnh huyết dụ chân trĩ: Giai đoạn cây con đến 5- 6 lá, nếu đất quá ẩm, cây ngô dễ bị bệnh huyết dụ chân trĩ. Tiến hành xới phá váng, sử dụng 10 - 15 kg super lân Lâm Thao ngâm trong nước giải ngấu, pha loãng tưới 2 - 3 lần, hoặc sử dụng các loại phân bón chuyên dùng siêu ra rễ: K-humate, humic, siêu lân,...phun cho cây 2- 3 lần, mỗi lần cách nhau 3- 5 ngày, giúp bộ rễ nhanh hồi phục, cây phát triển tốt.

**3. Đối với cây lạc Xuân:** Tập trung chăm sóc sớm và phòng trừ kịp thời bệnh lở cổ rễ giai đoạn cây con.

- Bón thúc lần 1 (khi cây 3-5 lá): 25kg NPK-S Lâm Thao 3-9-6+6S.

- Bón thúc lần 2 (Khi cây lạc ra hoa): Vãi thêm trên thân lá 15 kg vôi bột.

- Chăm sóc:

+ Khi cây có 2 - 3 lá thật, tiến hành xới phá váng không vun để tạo độ thoáng dưới gốc để cho 2 lá mầm lộ ra, tạo điều kiện cạnh tranh cấp 1 phát triển tốt.

+ Khi cây có 7 - 8 lá thật, trước khi lạc ra hoa, xới sâu 5 - 6 cm giữa hàng tạo cho đất tơi xốp, thoáng khí, để rễ lạc sinh trưởng phát triển tốt, chú ý không vun gốc.

+ Khi lạc ra hoa rộ 7 - 10 ngày tiến hành xới xáo lần 3 kết hợp vun gốc giúp lạc đâm tia, tạo củ thuận lợi.

- Phòng trừ bệnh lở cổ rễ (chết cây con): Bệnh thường xuất hiện giai đoạn cây con, trong điều kiện thời tiết mưa Xuân nhiều, độ ẩm cao. Khi bệnh chớm xuất hiện, cần phun phòng trừ bằng một trong các thuốc đặc trị như: Amistar 250SC, Validacin 5SL, Bonanza 100SL,... phun kép 2 lần cách nhau 5 - 7 ngày để đạt hiệu quả phòng trừ cao.

Đề nghị Trung tâm cung ứng dịch vụ công tăng cường thời lượng, tuyên truyền nội dung hướng dẫn; trưởng các thôn thường xuyên kiểm tra, nắm bắt địa bàn, tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng vụ Chiêm Xuân 2026 đạt hiệu quả./.

***Nơi nhận:***

- T.trực ĐU, HĐND, UBND xã (B/cáo);
- Các trưởng thôn (Thực hiện);
- Trung tâm cung ứng DVC (Đưa tin);
- Lưu VP, KT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Hà Đức Hòa**