

UBND XÃ THỌ XUÂN
TRUNG TÂM
CUNG ỨNG DỊCH VỤ CÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /HD-TTCUDVC
V/v hướng dẫn chăm sóc, phòng trừ
sâu bệnh cây trồng vụ Chiêm Xuân.

Thọ Xuân, ngày 12 tháng 3 năm 2026

Kính gửi: - UBND xã Thọ Xuân;
- Trưởng thôn các thôn.

Trong những ngày qua, điều kiện thời tiết sáng sớm có sương mù, độ ẩm không khí cao, xen kẽ có mưa phùn, nhiệt độ tăng dần, là điều kiện thuận lợi cho các đối tượng sâu, bệnh phát sinh gây hại, nhất là bệnh đạo ôn lá. Để chủ động chăm sóc, phát hiện sớm và phòng trừ sâu bệnh kịp thời, bảo vệ sản xuất vụ Chiêm Xuân 2026, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công, hướng dẫn chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng vụ Chiêm Xuân, cụ thể như sau:

1. Các biện pháp chăm sóc

1.1. Trên diện tích cây lúa

- Khi ruộng lúa đạt số nhánh hữu hiệu, thực hiện các biện pháp khống chế nhánh vô hiệu, bằng cách đưa nước vào ruộng từ 5 - 7 cm hoặc rút nước lộ ruộng từ 7 - 10 ngày, giúp rễ lúa ăn sâu, tăng khả năng hấp thụ dinh dưỡng, cứng cây, chống đổ tốt.

- Bón thúc đợt 2 (**bón đón đòng**): Bón 5 - 7 kg kali đỏ để tăng tỷ lệ hạt chắc, hạt mẩy, tăng khả năng chống chịu. Nếu ruộng lúa xấu, bón bổ sung thêm 1-2 kg ure. Đây cũng là thời kỳ khủng hoảng nước, nếu để thiếu nước lúa bị nghẹn đòng, trổ bông không đều, giảm năng suất.

1.2. Trên diện tích ngô: Sử dụng phân bón (tính cho 1 sào 500m²):

- Bón thúc đợt 1 (ngô 3- 5 lá): 6-7 kg ure + 3- 4 kg kali hoặc bón 15 kg NPK chuyên thúc cây ngô (Tiến Nông). Bón cách gốc 5-7 cm, kết hợp xới xáo, vun gốc, lấp phân.

- Bón thúc đợt 2 (ngô 7- 9 lá): 7- 8 kg ure + 4 kg kali hoặc bón 17 kg NPK chuyên thúc cây ngô (Tiến Nông). Bón cách gốc 7-10 cm, kết hợp vun cao gốc để tạo thế chống đổ cho cây.

- Bón thúc lần 3 (ngô xoáy loa kèn): Tạo điều kiện cho ngô phát triển bấp to đều, hạt mẩy, chủ yếu sử dụng kali: 3- 4 kg kali + 1-2 kg ure. Giai đoạn trổ cờ - phun râu, là thời điểm cần cần tưới đủ nước, quyết định năng suất.

1.3. Trên diện tích cây màu, rau đậu các loại: Tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, gieo trồng đúng lịch thời vụ, đảm bảo cây mọc mầm, sinh trưởng, phát triển tốt. Sử dụng phân hỗn hợp N:P:K loại 10:10:5 cho cây ngô, NPK 3:9:6 cho cây lạc, đậu và các loại rau màu khác.

2. Phòng trừ sâu bệnh

2.1. Sâu bệnh trên cây lúa

* **Bệnh nghẹt rễ, vàng sinh lý (do ngộ độc hữu cơ)**: Phát sinh trong điều kiện thời tiết thay đổi đột ngột, đất chưa được phơi ải, bệnh phát sinh làm ngọn lá lúa biến vàng đến đỏ khô, cây lúa đẻ nhánh kém, do đất thiếu ôxi gây yếm khí.

Trên diện tích lúa bị ngộ độc hữu cơ xuất hiện sau cấy 25-30 ngày, ngừng bón đạm, xử lý vôi bột 15-20 kg/sào + 10-15 kg sunpe lân lâm thao/1 sào 500 m² hoặc bổ sung chế phẩm Tricoderma, kết hợp làm cỏ sục bùn để giải phóng khí độc trong đất, kết hợp phun phân qua lá có hàm lượng lân cao như: A-H 503; K.Humate (KH), Pennac P,...phun từ 2-3 lần, mỗi lần cách nhau 3-5 ngày; khi cây phát triển trở lại, tiến hành chăm bón theo quy trình.

* **Đối với bệnh đạo ôn lá:** Tăng cường kiểm tra trên diện tích trồng thấp, lúa xanh tốt, trên các giống nhiễm như các giống lúa Nếp, Bắc thơm số 7, TBR 225,...: Vết bệnh lúc đầu chỉ nhỏ như đầu mũi kim, màu xám xanh, sau đó chuyển dần sang màu nâu, lan rộng dần ra thành hình thoi, xung quanh màu nâu đậm, giữa màu xám trắng, nhiều vết bệnh liên kết làm lá bị cháy, cây lúa bị lụi.

Trên diện tích nhiễm bệnh, ngừng ngay bón đạm, không phun phân bón lá có chứa đạm, duy trì mực nước trong ruộng (không để khô hạn); phun trừ ngay khi bệnh mới xuất hiện bằng 1 trong các loại thuốc đặc hiệu như: Katana20SC, Beam 75WP, Fujione 40EC, Filia 525 SE, Bump 650WP, Tricom 75WP; phun khi bệnh mới xuất hiện (*vết chấm kim*), phun kép 2 lần, mỗi lần cách nhau 5-7 ngày bằng các loại thuốc khác hoạt chất thuốc phun lần đầu, phun ướt đầm lá.

* **Sâu cuốn lá:** Sâu non xuất hiện gây hại từ cuối tháng 3, trên diện tích cuối để nhánh đến đứng cái. Nếu mật độ từ 50 con/m² trở lên, hướng dẫn nông dân phun một trong các loại thuốc: Regent 800WG, Dibadan 95WP, Virtako 40WG, Director 70EC,...Pha theo hướng dẫn trên bao bì, phun vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát. Phun kép lần 2 (*phun sau lần 1 từ 5 - 7 ngày*).

* **Bệnh khô vằn:** Khi bệnh chớm xuất hiện, đặc biệt giai đoạn cuối để nhánh – làm đòng; phun trừ bằng một trong các loại thuốc: Validacin 5SL, Anvil 5SC, Chevin, Pencycuron và hỗn hợp hoạt chất Saipora Super 350SC,...Khi phun có thể kết hợp với kali trắng (K₂SO₄) để tăng hiệu quả phòng trừ (thêm 50 g kali trắng cho 1 bình 16 lít/sào cùng cối thuốc trừ bệnh).

2.2. Đối với cây ngô: Phòng trừ sâu bệnh giai đoạn cây con chủ yếu sâu keo, sâu xám, đặc biệt lưu ý sâu keo mùa thu,...Đối với sâu keo mùa thu dùng các loại thuốc có hoạt chất Indoxacarb, như: Clever (150SC, 300WG); hoạt chất Bacillus thuringensis để phun.

2.3. Các loại cây trồng khác: Tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, tiến hành xử lý đất bằng 25 kg vôi bột/sào, làm đất kỹ, tơi xốp, gieo trồng các loại cây trồng vụ Xuân như: ngô, lạc, đậu tương, rau màu,...Bón phân cân đối, tăng cường bón các loại phân hữu cơ vi sinh, phân chuồng hoai mục, sử dụng phân NPK chuyên dùng cho từng loại cây trồng.

2.4. Đối với chuột hại: Tiếp tục thực hiện Kế hoạch Kế hoạch số 44/KH-UBND và Thông báo số 145/TB-UBND ngày 05/03/2026 của UBND xã Thọ Xuân về việc tổ chức phát động diệt chuột đồng loạt bảo vệ sản xuất vụ Chiêm Xuân năm 2026; Hướng dẫn số 06/HD-TTCUDVC ngày 06/03/2026 về việc hướng dẫn biện pháp diệt chuột, bảo vệ sản xuất, môi trường, sức khỏe.

Đề nghị Trưởng các thôn, các hội viên tăng cường công tác thông tin tuyên truyền cho người dân nắm bắt và thực hiện nội dung hướng dẫn chăm sóc, phòng trừ chuột, sâu bệnh hại trên cây trồng vụ Chiêm Xuân có hiệu quả./.

Nơi nhận:

- Như trên (thực hiện);
- Thường trực Đảng ủy (b/cáo);
- Chủ tịch, các PCT (b/cáo);
- Phòng Kinh tế (b/cáo);
- Lưu TT CU DVC.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Bùi Thị Nga