

UBND XÃ THỌ XUÂN
TRUNG TÂM CUNG ỨNG
DỊCH VỤ CÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /HD-TTCUDVC
V/v hướng dẫn chăm sóc, phòng trừ
sâu bệnh cho cây lúa vụ Mùa 2026.

Thọ Xuân, ngày 7 tháng 8 năm 2026

Kính gửi:

- UBND xã Thọ Xuân;
- Trưởng thôn các thôn trên địa bàn xã.

Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, xen kẽ có mưa giông vào chiều tối, là điều kiện thuận lợi cho các đối tượng sâu bệnh phát sinh, gây hại cuối vụ. Qua kiểm tra thăm đồng, hiện nay cục bộ trên diện tích lúa mùa tại khu vực thôn Lễ Nghĩa, Lư Khánh Thượng, Lư Khánh Đông,...đã xuất hiện các đối tượng sâu bệnh như: Sâu đục thân bướm 2 chấm, bệnh vàng lá gân xanh (kiểm tra nếu mật độ rầy xanh đuôi đen tiến hành phun trừ để tránh lây lan). Để chủ động phòng trừ các đối tượng sâu bệnh trên cây lúa, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công hướng dẫn các biện pháp chăm sóc và phòng trừ như sau:

1. Biện pháp chăm sóc

Tập trung bón đón đồng khi lúa phân hóa đồng bước 1-2, để kích thích quá trình phân hóa mầm hoa, tăng số gié, số hạt và tỷ lệ hạt chắc cao: Diện tích lúa thuần: Bón 10 kg N.P.K.Si (vì nông dân việt – chuyên thúc) + 2- 3 kg kali đỏ; Diện tích lúa lai: Bón 12 kg N.P.K.Si (vì nông dân việt – chuyên thúc) + 5 kg kali đỏ.

Trong giai đoạn lúa phân hóa đồng đến trổ bông, nước tưới đóng vai trò quan trọng, quyết định đến 60 - 70% năng suất; Nếu ruộng lúa thiếu nước lúa bị nghẹn đồng, năng suất giảm.

2. Biện pháp phòng trừ sâu bệnh

2.1. Đối với sâu cuốn lá nhỏ: Dự báo trưởng thành sâu cuốn lá nhỏ lúa 5 vũ hóa rộ từ 10-15/8/2026, sâu non lúa 6 (tuổi 1, 2) nở rộ từ 15-20/8/2026, gây hại giai đoạn lúa ôm đồng đến trổ bông.

Trên những diện tích bị sâu gây hại với mật độ cso sâu cuốn lá nhỏ từ 50 con/m² trở lên (giai đoạn đẻ nhánh - đứng cái) và mật độ từ 20 con/m² trở lên (giai đoạn ôm đồng đến trổ) cần tiến hành phun phòng trừ bằng các loại thuốc: Chlorin 10SC, Incipio 200SC, Clever 150SC, Clever 300SC, Voliam Targo 063SC, Obaone 95WG, Prevathon (5SC, 35WG), Vitako 40WG,... phun đều ướt lá khi sâu non tuổi 1, tuổi 2 mới xuất hiện hoặc sau khi bướm rộ 5 - 7 ngày.

2.2. Sâu đục thân bướm 2 chấm: Dự báo trưởng thành sâu đục thân 2 chấm lúa 5 vũ hóa rộ từ 12-15/8/2026, sâu non tuổi 1, 2 nở rộ từ 17- 22/8/2026, giai đoạn ôm đồng đến trổ bông.

Khi mật độ ổ trứng từ 0,3-0,5 ổ/m² trở lên thì phun trừ bằng các loại thuốc: Incipio 200SC, Voliam Targo 063SC, Vitako 40WG,...phun khi sâu non mới nở tuổi 1, 2 hoặc phun sau khi bướm rộ 5-7 ngày.

2.3. Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn: Bệnh phát sinh mạnh sau các trận mưa, giông. Khi bệnh xuất hiện tuyệt đối không bón phân hay phun thuốc kích thích sinh trưởng; Phun phòng sớm khi bệnh mới xuất hiện bằng một trong các loại thuốc: Kasumin 2SL, Kata 2SL, Ankamycin 30SL, Ychatot 900SP và phun lại lần

2 cách 5-7 ngày nếu bệnh vẫn tiếp tục phát sinh.

2.4. Đối với rầy, rầy lưng trắng: Bệnh gây hại đoạn lúa làm đòng, trổ bông, chắc xanh; Phát sinh trong điều kiện nhiệt độ, ẩm độ cao, nắng mưa xen kẽ.

- Giai đoạn lúa trước khi trổ mật độ trên 1.000 con/m² phải phun trừ bằng các loại thuốc nội hấp, lưu dẫn như: Chess 50WG, Actara 25WG, Admitox 100SL, Actador 100WP,...

- Giai đoạn lúa sau khi trổ mật độ trên 2000 con/m² phun trừ bằng các loại thuốc có tính tiếp xúc như: Bassa 50EC (ND) và Penalty 40WP,...

Lưu ý: Đối tượng rầy lưng trắng là môi giới truyền vius gây bệnh lùn sọc đen phương Nam, bệnh hại nguy hiểm; cần theo dõi, phát hiện sớm và phun trừ kịp thời (phun kép 2 lần, cách nhau 3 – 5 ngày).

Đề nghị Trưởng thôn các thôn, các hội viên, đoàn viên tăng cường tuyên truyền hướng dẫn chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây lúa để bà con nắm bắt thực hiện có hiệu quả.

Nơi nhận:

- Như trên (thực hiện);
- Thường trực Đảng ủy, HĐND (b/cáo);
- Chủ tịch, các PCT (b/cáo);
- Lưu TT CU DVC.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Bùi Thị Nga