

Số: / TB - UBND

Thọ Xuân, ngày tháng năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc hướng dẫn thực hiện các biện pháp kỹ thuật trong chăn nuôi lợn An toàn sinh học (ATSH), phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) trên địa bàn xã Thọ Xuân

Thực hiện công điện số 05/CĐ- UBND ngày 19/7/2025 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc tập trung triển khai đồng bộ quyết liệt có hiệu quả các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu phi.

Để chủ động ngăn chặn bệnh dịch tả lợn Châu phi xâm nhập, bùng phát, lây lan trên địa bàn, đảm bảo phát triển chăn nuôi lợn bền vững, UBND xã Thọ Xuân thông báo hướng dẫn một số biện pháp kỹ thuật trong chăn nuôi lợn An toàn sinh học (ATSH) để phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP), cụ thể như sau:

1. Thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp kỹ thuật trong chăn nuôi an toàn sinh học nhằm phòng ngừa, kiểm soát và loại trừ các tác nhân gây bệnh (như vi rút, vi khuẩn, ký sinh trùng...) để bảo vệ sức khỏe vật nuôi, con người và môi trường, bao gồm:

- Chọn địa điểm và thiết kế chuồng, trại chăn nuôi hợp lý, vị trí chuồng nuôi phải tách biệt với nơi ở của người chuồng nuôi thoáng mát, dễ vệ sinh, Có lưới bao xung quanh chuồng nuôi và biện pháp khác ngăn chặn ngăn được động vật hoang dã và côn trùng. Không sử dụng chung dụng cụ chăn nuôi giữa các chuồng trong quá trình nuôi. Có hệ thống thu gom, xử lý nước thải, chất thải đảm bảo vệ sinh môi trường.

- Kiểm soát người và phương tiện vào ra khu vực chăn nuôi: Hạn chế người ra vào khu vực chăn nuôi. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát phương tiện vận chuyển, ra vào khu vực chăn nuôi. Không để phương tiện vận chuyển của thương lái, vận chuyển thức ăn, con giống,...đến khu vực chăn nuôi. Phương tiện vận chuyển phải dừng ở bên ngoài chuồng, trại để vệ sinh, khử trùng, tiêu độc trước khi vào khu vực chuồng, trại nuôi.

- Quản lý đàn lợn: Chỉ nhập Lợn về nuôi khi có nguồn gốc rõ ràng, khỏe mạnh, chất lượng con giống đảm bảo. Lợn nhập đàn trong vùng dịch phải có nguồn gốc từ cơ sở không nhiễm bệnh và phải có kết quả xét nghiệm âm tính với bệnh DTLCP, đồng thời phải thông báo với chính quyền địa phương và cơ quan thú y để được theo dõi, quản lý. Đối với lợn nhập từ tỉnh khác, có giấy chứng nhận kiểm dịch, đồng thời thông báo kiểm dịch cho nơi đến trước khi vận chuyển lợn về địa phương. Trước khi nhập đàn, nuôi cách ly ít nhất 2 tuần. Không tăng đàn, tái đàn khi chưa đảm bảo các điều kiện chăn nuôi an toàn sinh

học. Thực hiện tốt việc kê khai hoạt động chăn nuôi lợn khi nuôi mới, nhập đàn, tái đàn với chính quyền cấp xã theo quy định.

- Quản lý nguồn thức ăn, nước uống: sử dụng thức ăn có nguồn gốc rõ ràng, không bị hỏng, mốc, còn hạn sử dụng, đảm bảo chất lượng và an toàn. Trường hợp sử dụng thức ăn tận dụng phải được xử lý nhiệt trước khi cho ăn. Không sử dụng thức ăn thừa trong máng ăn của đàn lợn đã xuất chuồng và thức ăn của đàn lợn đã bị dịch bệnh cho đàn lợn mới. Nguồn nước cho chăn nuôi lợn phải đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch bệnh DTLCP, khuyến cáo sử dụng nước ngầm, hạn chế sử dụng các nguồn nước mặt. Bổ sung chất dinh dưỡng, khoáng chất, các loại vitamin để nâng cao sức đề kháng cho vật nuôi.

- Định kỳ phát quang bụi rậm, khơi thông và vệ sinh cống rãnh ngoài chuồng nuôi ít nhất 2 lần/tháng. Phải vệ sinh máng ăn, máng uống hàng ngày. Thiết bị, dụng cụ và phương tiện phục vụ trong chăn nuôi phải được tiêu độc khử trùng thường xuyên.

- Thực hiện việc tiêm phòng định kỳ các loại vắc xin cho đàn lợn, đảm bảo cho đàn lợn của hộ gia đình được tiêm đầy đủ, đúng liều, đúng kỹ thuật.

- Dọn vệ sinh, khử trùng bằng vôi bột hoặc định kỳ phun thuốc sát trùng xung quanh khu chăn nuôi, chuồng nuôi ít nhất 2 lần/tuần; phun thuốc sát trùng trong chuồng nuôi ít nhất 1 lần/tuần khi không có dịch bệnh, và ít nhất 2 lần/tuần khi có dịch bệnh; phun thuốc sát trùng trên lợn ít nhất 2 lần/tuần khi có dịch bệnh bằng các dung dịch sát trùng thích hợp theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Thu gom và xử lý chất thải, nước thải hàng ngày theo quy trình đảm bảo vệ sinh môi trường.

2. Thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch

- Bệnh DTLCP, bệnh lây lan qua đường hô hấp, thông qua sự tiếp xúc trực tiếp/gián tiếp với các vật thể nhiễm vi rút, bệnh có thể tồn tại thời gian dài trong thời tiết rất lạnh và rất nóng; Lợn mắc bệnh có biểu hiện bỏ ăn, ủ rũ, sốt cao 42-43⁰C. Cần chủ động theo dõi đàn lợn của hộ để phát hiện các dấu hiệu và triệu chứng lâm sàng của lợn nhiễm bệnh. Khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ bệnh, báo cáo ngay về trưởng thôn, khu phố hoặc cán bộ thú y xã, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm xã, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp Thọ Xuân để kiểm tra, xử lý, kịp thời lấy mẫu xét nghiệm khi cần thiết và hướng dẫn quy trình tiêu huỷ lợn bệnh, lợn chết và các biện pháp phòng chống dịch bệnh tái phát, lây lan.

- Thực hiện “ 5 không” trong phòng chống dịch bệnh: (1) Không giấu dịch; (2) Không mua bán, vận chuyển lợn bệnh, lợn chết, lợn không rõ nguồn gốc; (3) Không giết mổ tiêu thụ lợn bệnh, lợn chết, lợn không rõ nguồn gốc; (4) Không vứt lợn chết ra môi trường làm phát tán dịch bệnh và gây ô nhiễm môi trường; (5) Không sử dụng thực phẩm thừa của người làm thức ăn cho lợn, kể cả khi nấu chín

- Khi phát hiện tình trạng vứt xác động vật ra môi trường, cần phản ánh ngay về Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của xã để kịp thời xác nhận, lập biên bản và xử lý nghiêm theo qui định về hành vi, vi phạm pháp luật.

Trên đây là hướng dẫn chi tiết về chăn nuôi ATSH để phòng, chống bệnh DTLCP. Chủ tịch UBND xã Thọ Xuân đề nghị chủ trang trại, gia trại và chủ hộ chăn nuôi lợn trên địa triển khai thực hiện có hiệu quả./.

Nơi nhận:

- Trung tâm cung ứng DV công xã (T/báo);
- Lưu: VT, KT.

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Văn Hoàn