

Số: /TB-TT DVTH

Phủ Thông, ngày 16 tháng 9 năm 2026

THÔNG BÁO
Tình hình Rầy nâu, rầy lưng trắng hại cây lúa vụ mùa năm 2026

Qua kết quả kiểm tra sâu, bệnh hại cây lúa của Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Phủ Thông. Hiện nay cây lúa vụ mùa đang giai đoạn ôm đòng - chuẩn bị trổ, Rầy nâu, rầy lưng trắng (bọ rầy) xuất hiện và gây hại trên diện rộng, mật độ phổ biến khoảng 500 con/m², cao 2.000/ m², cục bộ tại một số diện tích lên tới 3.000 - 5.000 con/m²; diện tích nhiễm khoảng 20 ha, trong đó nhiễm nhẹ 8ha, nhiễm trung bình, 7ha, nhiễm nặng 5 ha; phân bố rải rác tại các thôn trên địa bàn xã.

Mật độ rầy hiện nay đang có chiều hướng gia tăng nhanh cả về số lượng và diện tích phân bố.

Điều kiện thời tiết mưa, nắng xen kẽ như hiện nay, kết hợp với giai đoạn sinh trưởng của cây lúa làm đòng - trổ là điều kiện thuận lợi cho rầy tiếp tục sinh sản, gia tăng mật độ và phát tán nhanh. Nếu không được phát hiện và phòng trừ kịp thời, sẽ gây vàng và “cháy rầy” cục bộ. Đây là thời điểm cần đặc biệt lưu ý, đề nghị các thôn và các hộ trồng lúa không chủ quan, không chờ đến khi ruộng có biểu hiện vàng lá, khô héo mới tiến hành phun thuốc.

Thời gian phun trừ: Để hạn chế sự gia tăng mật độ và tránh rầy lây lan trên diện rộng, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp đề nghị các thôn thông báo, tuyên truyền các hộ trồng lúa kiểm tra đồng ruộng, tập trung phun phòng trừ rầy nâu, rầy lưng trắng một cách đồng loạt trong thời gian **từ ngày 16/9 đến ngày 20/9/2026**.

Việc phun trừ cần thực hiện tập trung, đồng loạt trên những diện tích có mật độ rầy cao và các khu vực liền vùng, liền thửa, tránh tình trạng hộ phun, hộ không phun làm rầy di chuyển, phát tán và gây tái nhiễm trở lại.

Đối với những ruộng có mật độ rầy cao, cần kiểm tra thường xuyên sau phun, đánh giá hiệu quả phòng trừ và có biện pháp xử lý tiếp theo khi cần thiết.

Biện pháp phòng trừ: Phun thuốc trừ rầy với những ruộng lúa có mật độ 20-50 con/khóm (1.000 - 2.500 con/m²). Sau khi phun thuốc thực hiện đúng thời gian cách ly để đảm bảo an toàn cho nông sản.

- Đối với những diện tích lúa đang giai đoạn làm đòng - trổ, ruộng chủ động nước nên sử dụng một trong các loại thuốc có tác dụng lưu dẫn như: Actara® 25WG, Chess® 50WG, Sutin 5EC, Chersieu 50WG; Sachray 200WP...

- Đối với những ruộng khô hạn và lúa từ giai đoạn chắc xanh đến chín, phun trừ khi mật độ rầy khoảng 1.000 con/m² trở lên bằng một trong các loại thuốc có tác dụng tiếp xúc như: Bassa 50EC, Applaud 25SC, 25WP, Sieuray 250WP, Vibasa 50EC... *(Yêu cầu phải rẽ lúa thành luống, mỗi luống rộng từ 0,6 - 0,8m, hạ thấp vòi phun để thuốc tiếp xúc trực tiếp với rầy ở dưới bẹ và gốc lúa)*. Những ruộng có mật độ rầy cao phải phun kép 2 lần, cách nhau từ 5 - 7 ngày. Dùng luân phiên các loại thuốc để tránh tính kháng thuốc của rầy.

*** Lưu ý:** Khi phun cần rẽ hàng lúa thành từng băng, đưa vòi phun xuống sát phần gốc, bẹ lúa để thuốc tiếp xúc trực tiếp với rầy; tránh chỉ phun phần tán lá phía trên vì hiệu quả phòng trừ sẽ thấp.

- Các đối tượng khác như: Bệnh đạo ôn, bệnh khô vằn, sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân thực hiện theo văn bản số 44/CV-TTĐVTH ngày 06/8/2026 của Trung tâm Dịch vụ tổng hợp chủ động theo dõi, phòng trừ sâu, bệnh hại lúa vụ mùa năm 2026; văn bản số 52/TTĐVTH ngày 03/9/2023 của Trung tâm Dịch vụ tổng hợp Về việc tăng cường phòng trừ sâu bệnh hại lúa vụ mùa.

Với nội dung trên, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp đề nghị Trưởng các thôn khẩn trương thông báo đến các hộ dân; tuyên truyền để bà con không chủ quan trước tình hình rầy đang có chiều hướng gia tăng, đồng thời vận động các hộ chủ động kiểm tra ruộng và tổ chức phun trừ kịp thời./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, PCT UBND xã (B/c);
- Phòng Xây dựng NN&MT (P/h);
- Các ông, bà Trưởng thôn (T/h);
- Lưu: Trung tâm DVTH.

GIÁM ĐỐC

Đinh Thị Xuyên