

THÔNG BÁO KHẨN
Phòng trừ rầy hại trên trà lúa mùa muộn năm 2026

Thực hiện Thông báo số 1479/TB-CCTTBVTV ngày 21/9/2026 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Thái Nguyên về việc phòng trừ rầy hại trên trà lúa mùa muộn năm 2026 (có văn bản gửi kèm). Hiện tại lúa mùa muộn đang giai đoạn ôm đòng - trổ bông, đây là thời điểm xung yếu quyết định năng suất lúa. Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do rầy gây ra UBND xã đề nghị Trung tâm Dịch vụ tổng hợp, các Trưởng thôn khẩn trương thực hiện 1 số nội dung như sau:

1. Hướng dẫn nông dân sử dụng các loại thuốc BVTV theo nội dung tại Công văn số 3033/UBND-TTĐVTH của UBND xã về phòng trừ rầy nâu, rầy lưng trắng gây hại cây lúa vụ Mùa 2026: “- Đối với những diện tích lúa đang giai đoạn làm đòng - trổ, ruộng chủ động nước cần tăng cường kiểm tra đồng ruộng để phát hiện ổ rầy, phun thuốc trừ rầy với những ruộng lúa có mật độ 20 - 50 con/khóm (1.000 - 2.500 con/m²). Sử dụng một trong các loại thuốc có tác dụng lưu dẫn như: Chessin 600WP, Actara® 25WG, Chess® 50WG, Sutin 5EC, Chersieu 50WG, Sachray 200WP...

- Đối với những ruộng khô hạn và lúa từ giai đoạn chắc xanh đến chín, phun trừ khi mật độ rầy khoảng 1.000 con/m² trở lên bằng một trong các loại thuốc có tác dụng tiếp xúc như: Bassa 50EC, Applaud 25SC, 25WP, Sieuray 250WP, Vibasa 50EC... (Yêu cầu phải rẽ lúa thành luống, mỗi luống rộng từ 0,6 - 0,8m, hạ thấp vòi phun để thuốc tiếp xúc trực tiếp với rầy ở dưới bẹ và gốc lúa). Những ruộng có mật độ rầy cao phải phun kép 2 lần, cách nhau từ 5 - 7 ngày. Dùng luân phiên các loại thuốc để tránh tính kháng thuốc của rầy. Sau khi phun thuốc thực hiện đúng thời gian cách ly để đảm bảo an toàn cho nông sản”.

Ngoài những loại thuốc BVTV đã khuyến cáo trên có thể sử dụng thuốc SAMURAI 800WG, LANRO 500EC để phun trừ.

2. Những diện tích hiện đang bị rầy gây hại có mật độ cao phải tổ chức phun trừ tập trung từ nay đến hết ngày 24/9/2026, sau khi phun lần 1 nếu mật độ rầy còn cao cần tiến hành phun lần 2 sau lần 1 từ 5-7 ngày. Tiến hành phun trừ vào chiều mát, không phun buổi sáng là thời gian lúa phơi màu (đối với lúa đang trổ bông). Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có tác dụng kép như xông hơi, tiếp xúc, lưu dẫn.

3. Sau khi phun trừ rầy hiệu quả, tiến hành chăm sóc lúa như sau:

- Duy trì mực nước từ 2 - 3 cm trong ruộng để rễ lúa hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn, không để ruộng bị khô hạn hoặc ngập úng quá sâu.

- Phun bổ sung phân bón lá giàu kali hoặc các vi chất dinh dưỡng giúp lúa cứng cây, phục hồi nhanh lá và tăng khả năng quang hợp. Tuyệt đối không bón phân đạm (urê) ngay sau khi trừ rầy vì cây lúa mềm yếu nguy cơ rầy quay trở lại, đồng thời phát sinh bệnh hại bẹ lá (Không phun phân qua lá với những diện tích bị bệnh trên lá).

- Phòng trừ bệnh kể phát: Khi rầy hại nặng, vết chích có thể tạo điều kiện cho nấm, vi khuẩn gây bệnh phát sinh; cần theo dõi để xử lý kịp thời bằng các thuốc đặc trị phù hợp.

4. Hướng dẫn nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc “4 đúng”, đảm bảo trang bị đầy đủ bảo hộ lao động khi tiếp xúc với thuốc; thu gom và xử lý an toàn, đúng quy định với vỏ bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng.

Căn cứ chỉ đạo của UBND xã, các đơn vị và các thôn triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên (t/h);
- CT và các PCT UBND xã;
- Phòng Kinh tế xã;
- LĐVP;
- Lưu: VT, TTDVTH. Manhnhh.



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lý Anh Thân