

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
XÃ VĨNH THÔNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-TTĐVTH

V/v chủ động phòng, trừ sinh vật gây  
hại cây lúa vụ Xuân năm 2026

Vĩnh Thông, ngày tháng 4 năm 2026

Kính gửi:

- Phòng Kinh tế xã;
- Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã;
- Các thành viên BCD, tổ giúp việc BCD theo Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 20/01/2026 của UBND xã Vĩnh Thông;
- Các thôn trên địa bàn xã;

Thực hiện Văn bản số 554/CCTTBVTV-TTBVTV ngày 24/3/2026 của Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh Thái Nguyên về việc động phòng, trừ sinh vật gây hại cây lúa vụ Xuân năm 2026.

Trong những ngày qua, do ảnh hưởng của nắng nóng, ẩm độ cao, xen kẽ có những đợt mưa dông về đêm và sáng sớm, là điều kiện thuận lợi cho sâu bệnh hại phát sinh, phát triển. Qua kết quả điều tra đồng ruộng cho thấy: Rầy nâu, rầy lưng trắng mật độ nơi cao 800 con/m<sup>2</sup>, cục bộ 1.500 con/m<sup>2</sup>; sâu đục thân tỷ lệ hại nơi cao 4%, cục bộ 7% danh bị hại; chuột hại tỷ lệ nơi cao 5%, cục bộ 8% danh bị hại; bệnh khô vằn tỷ lệ hại nơi cao 20%, cục bộ 42% danh bị hại; ngoài ra sâu cuốn lá nhỏ, bệnh đạo ôn lá, bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn gây hại nhẹ.

Dự báo thời gian tới, thời tiết và giai đoạn sinh trưởng của cây lúa rất thuận lợi cho các loại sâu, bệnh hại trên tiếp tục phát triển và gây hại mạnh, đặc biệt là thời gian trùng với dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nếu không chủ động, lơ là chủ quan trong công tác phòng trừ sẽ ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng lúa vụ.

Trước diễn biến phức tạp của các loại sâu, bệnh hại trên cây lúa vụ Xuân, để chủ động phòng trừ, hạn chế thấp nhất thiệt hại và bảo đảm năng suất, sản lượng, UBND xã Vĩnh Thông yêu cầu các phòng, ban chuyên môn, đơn vị liên quan, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã và các Trưởng thôn chủ động triển khai thực hiện các biện pháp phòng trừ, tập trung vào một số đối tượng sâu, bệnh hại chính như sau:

### **1. Rầy nâu, rầy lưng trắng**

- Đối với những diện tích lúa đang giai đoạn làm đòng - trổ, ruộng chủ động nước, phun thuốc trừ rầy với những ruộng lúa có mật độ 40-50 con/khóm (2.000 - 2.500 con/m<sup>2</sup>) bằng một trong các loại thuốc có tác dụng lưu dẫn như: Actara<sup>®</sup> 25WG, Chess<sup>®</sup> 50WG, Sutin 5EC, Chersieu 50WG, Sachray 200WP...

- Đối với những ruộng khô hạn và lúa từ giai đoạn chắc xanh đến chín, phun trừ khi mật độ rầy khoảng 1.000 con/m<sup>2</sup> trở lên bằng một trong các loại thuốc có tác dụng tiếp xúc như: Bassa 50EC, Applaud 25SC, 25WP, Sieuray 250WP,

Vibasa 50EC... (Yêu cầu phải rẽ lúa thành luống, mỗi luống rộng từ 0,6 - 0,8m, hạ thấp vòi phun để thuốc tiếp xúc trực tiếp với rầy ở dưới bẹ và gốc lúa).

Những ruộng có mật độ rầy cao phải phun kép 2 lần, cách nhau từ 5 - 7 ngày. Dùng luân phiên các loại thuốc để tránh tính kháng thuốc của rầy.

**2. Sâu cuốn lá nhỏ:** Theo dõi chặt chẽ diễn biến, xác định thời điểm sâu non nở, đặc biệt chú ý trên trà lúa Xuân muộn giai đoạn đứng cái - làm đòng, phun thuốc trừ sâu nếu thấy mật độ sâu non từ 20 con/m<sup>2</sup> trở lên (với lúa đang ở giai đoạn đứng cái làm đòng), 50 con/m<sup>2</sup> trở lên (với lúa đang giai đoạn đẻ nhánh), những ruộng có mật độ sâu cao trên 100 con/m<sup>2</sup> phải phun kép 2 lần cách nhau từ 4 - 5 ngày. Sử dụng một trong các thuốc trừ sâu cuốn lá hại lúa được đăng ký trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam ví dụ như: Clever 150SC, 300WG, Virtako® 40WG, Patox 95SP, Comda gold 5WG, Match® 050EC...

### 3. Sâu đục thân

- Theo dõi diễn biến của trưởng thành, mật độ ổ trứng và thời điểm sâu non nở đặc biệt trên những ruộng đang trong giai đoạn đứng cái - làm đòng - trổ bông.

- Sử dụng một trong các thuốc trừ sâu đục thân hại lúa đã được đăng ký trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam (như: Virtako® 40WG, Gà nòi 95SP, Patox 95SP, Aremec 45EC, Shepatin 90EC, Neretox 18SL, 95WP...) để phun trừ đối với những ruộng có mật độ ổ trứng trên 0,3 ổ/m<sup>2</sup> (3 ổ/10 m<sup>2</sup>), phun vào thời điểm sâu non mới nở; những ruộng có mật độ ổ trứng cao trên 1 ổ/m<sup>2</sup> cần phun kép 2 lần, cách nhau 4-5 ngày.

### 4. Bệnh đạo ôn lá và đạo ôn cổ bông

- Đối với đạo ôn lá: Thực hiện theo Công văn tăng cường phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng số 386/CCTTBVTV-TTBVTV ngày 27/3/2026 của Chi cục Trồng trọt và BVTV.

- Đối với bệnh đạo ôn cổ bông, cổ gié: Tiến hành phun thuốc phòng bệnh với những ruộng lúa đã bị nhiễm đạo ôn lá và những ruộng xung quanh, đặc biệt những ruộng cấy giống nhiễm như: J02, BC15, Nếp, TBR225... Sử dụng một trong các thuốc trừ bệnh đạo ôn hại lúa được đăng ký trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam như: Amistar Top® 325SC; Daconil 75WP; Fuji-One 40EC, 40WP; Katana 20SC; Fu-army 30WP, 40EC; Lúa vàng 20WP; Fuan 40EC...

Thực hiện phun thuốc khi lúa trổ khoảng 10% số bông trên ruộng hoặc ngay sau khi lúa trổ thoát; phun vào buổi chiều muộn khi vỏ trấu đã khép. Đối với những ruộng đã bị bệnh đạo ôn lá gây hại nặng, cần phun kép 2 lần (lần 1 trước khi lúa trổ 1-2 ngày, lần 2 sau khi lúa trổ thoát). Trường hợp sau phun gặp mưa to, phải tiến hành phun lại.

**5. Bệnh khô vằn:** Áp dụng tổng hợp các biện pháp chăm sóc cây khỏe, thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, kịp thời phát hiện ổ bệnh, phun thuốc trừ bệnh bằng một trong các loại thuốc trừ bệnh khô vằn hại lúa được đăng ký trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam ví dụ như: Saizole 5SC, Validacin 5SL; Tilt

Super® 300EC; Anvil® 5SC... Sau khi phun thuốc 5-7 ngày, kiểm tra lại, nếu bệnh chưa dừng phải phun lại.

**6. Bệnh bạc lá, bệnh đốm sọc vi khuẩn:** Bệnh tiếp tục phát sinh và gây hại mạnh sau những trận mưa giông. Khi xuất hiện bệnh, dừng bón phân đạm, không phun các chất kích thích sinh trưởng hoặc phân bón lá và luôn giữ đủ nước trong ruộng; phun phòng bệnh bằng một trong các loại thuốc như: Kasumin 2SL, Xantocin 40WP, Sansai 200 WP, Linacin 40SL, Totan 200WP, Ychatot 900SP, Xanthomix 20 WP... Sau khi phun thuốc 5 - 7 ngày, nếu bệnh chưa dừng phải tiến hành phun lại.

Ngoài ra, chú ý theo dõi mức độ phát sinh, gây hại của bọ xít dài, chuột, bệnh đen lép hạt, bệnh hoa cúc... để chủ động áp dụng các biện pháp phòng trừ kịp thời; hướng dẫn người dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc 4 đúng, đảm bảo tuân thủ thời gian cách ly, nồng độ, liều lượng theo hướng dẫn trên bao bì...

Với nội dung trên yêu cầu các phòng, ban ngành chuyên môn, các đơn vị liên quan, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp và các Trưởng thôn chủ động triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

\* *Gửi bản điện tử:*

- Như trên;
- Thường trực Đảng ủy, HĐND xã;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Ủy ban MTTQVN xã và các tổ chức chính trị - xã hội xã (P/h);
- Lưu: VT, KT.

\* *Gửi bản giấy :*

- 20 ông, bà Trưởng thôn.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Lê Hoàng Anh**