

UBND XÃ ĐỒNG PHÚC
TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 39 /TTDVTH
V/v khẩn trương phòng trừ sâu bệnh hại
lúa vụ Mùa, đặc biệt là rầy nâu,
rầy lưng trắng.

Đồng Phúc, ngày 22 tháng 9 năm 2026

Kính gửi: Các ông (bà) Trưởng thôn trong toàn xã

Thực hiện Công văn số 1455/CCTTBVTV-TTBVTV ngày 17 tháng 9 năm 2026 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Thái Nguyên về phòng trừ rầy nâu, rầy lưng trắng gây hại cây lúa vụ Mùa năm 2026; hiện nay cây lúa mùa muộn đang giai đoạn chuẩn bị làm đồng-ôm đồng; Thông báo số 1479/TB-CCTTBVTV ngày 21/9/2026 thông báo khẩn phòng trừ rầy hại trên trà lúa muộn năm 2026.

Hiện nay, lúa vụ Mùa trên địa bàn xã đang trong giai đoạn làm đồng - trở. Qua kiểm tra tại một số xứ đồng trên địa bàn xã, tình hình sâu bệnh hại lúa có chiều hướng gia tăng, đặc biệt là rầy nâu, rầy lưng trắng đang phát sinh, gây hại với mật độ cao tại một số diện tích, có nguy cơ gây cháy rầy, ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất nếu không được phòng trừ kịp thời.

Để chủ động phòng trừ, hạn chế thiệt hại do sâu bệnh gây ra, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã đề nghị Trưởng các thôn và các hộ dân sản xuất lúa tập trung thực hiện một số nội dung sau:

1. Khẩn trương kiểm tra và phòng trừ rầy nâu, rầy lưng trắng

Trưởng các thôn khẩn trương thông báo đến toàn thể các hộ có diện tích lúa đang bị rầy gây hại, tổ chức kiểm tra đồng ruộng, xác định những diện tích có mật độ rầy cao để phòng trừ đồng loạt, tránh tình trạng rầy phát sinh thành ổ lớn và lây lan sang diện tích xung quanh.

Tập trung chỉ đạo, vận động các hộ dân không chủ quan, không chờ rầy gây hại nặng mới phun.

Các hộ dân không chủ quan, cần khẩn trương phun thuốc phòng trừ đối với những ruộng có mật độ rầy cao, đặc biệt những diện tích đã được kiểm tra, phát hiện mật độ rầy vượt ngưỡng phòng trừ (đối với ruộng có mật độ 20-50 con rầy/khóm (tương đương khoảng 1.000–2.500 con/m²) cần tiến hành phun thuốc trừ rầy.

Đối với diện tích lúa đang ở giai đoạn làm đồng - trở, ruộng chủ động nước, sử dụng thuốc có tác dụng lưu dẫn theo danh mục và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn như: Actara® 25WG, Chess® 50WG, Sutin 5EC, Chersieu 50WG, Sachray 200WP...

Đối với ruộng khô hạn hoặc lúa từ giai đoạn chắc xanh đến chín, khi mật độ rầy khoảng 1.000 con/m² trở lên, sử dụng thuốc có tác dụng tiếp xúc như: Đầu trâu Merci 1.8EC, Shertin 5.0EC, Safari 250EC,...; khi phun cần rẽ lúa thành luống

rộng khoảng 0,6–0,8 m, hạ thấp vòi phun để thuốc tiếp xúc trực tiếp với rầy ở dưới bẹ và gốc lúa.

Những diện tích hiện đang bị rầy gây hại có mật độ cao phải tổ chức phun trừ tập trung từ nay đến hết ngày 24/9/2026, sau khi phun lần 1 nếu mật độ rầy còn cao cần tiến hành phun lần 2 sau lần 1 từ 5-7 ngày. Tiến hành phun trừ vào chiều mát, không phun buổi sáng là thời gian lúa phơi màu (đối với lúa đang trổ bông). Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có tác dụng kép như xông hơi, tiếp xúc, lưu dẫn.

- Sau khi phun trừ rầy hiệu quả, tiến hành chăm sóc lúa như sau: Duy trì mực nước từ 2 - 3 cm trong ruộng để rễ lúa hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn, không để ruộng bị khô hạn hoặc ngập úng quá sâu.

Phun bổ sung phân bón lá giàu kali hoặc các vi chất dinh dưỡng giúp lúa cứng cây, phục hồi nhanh lá và tăng khả năng quang hợp. Tuyệt đối không bón phân đạm (urê) ngay sau khi trừ rầy vì cây lúa mềm yếu nguy cơ rầy quay trở lại, đồng thời phát sinh bệnh hại bẹ lá (Không phun phân qua lá với những diện tích bị bệnh trên lá).

Phòng trừ bệnh kể phát: Khi rầy hại nặng, vết chích có thể tạo điều kiện cho nấm, vi khuẩn gây bệnh phát sinh; cần theo dõi để xử lý kịp thời bằng các thuốc đặc trị phù hợp.

2. Theo dõi, phòng trừ các đối tượng sâu bệnh khác

Bên cạnh rầy nâu, rầy lưng trắng, các thôn và hộ dân cần thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, chú ý các đối tượng sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân, bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn, bệnh đạo ôn cổ bông, khô vằn, chuột và các sinh vật gây hại khác.

Đặc biệt, sau các đợt mưa lớn, cần kiểm tra kỹ những diện tích lúa sinh trưởng kém, ruộng bị ngập úng hoặc có điều kiện ẩm độ cao để phát hiện sớm sâu bệnh và có biện pháp xử lý kịp thời.

3. Trưởng các thôn

Tổ chức thông báo khẩn trương nội dung phòng trừ sâu bệnh đến các hộ sản xuất lúa trên địa bàn.

Phối hợp với cán bộ chuyên môn của Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã kiểm tra, xác định các khu vực có mật độ rầy cao, nguy cơ gây hại lớn.

Đôn đốc các hộ dân có ruộng bị rầy gây hại khẩn trương phun trừ, không để phát sinh thành ổ và lây lan trên diện rộng.

Sau khi các hộ thực hiện phun thuốc, tiếp tục theo dõi đồng ruộng, kịp thời thông tin về Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã đối với những diện tích rầy còn mật độ cao hoặc có diễn biến bất thường.

4. Đối với các hộ sản xuất lúa

Đề nghị các hộ dân khẩn trương kiểm tra ruộng lúa của gia đình, đặc biệt kiểm tra kỹ phần gốc, bẹ lá và những khu vực lúa xanh tốt, um tùm để phát hiện rầy.

Đối với những ruộng có mật độ rầy cao, chủ động phun thuốc phòng trừ ngay, không để rầy tiếp tục gia tăng gây cháy rầy, ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng lúa.

Khi phun trừ rầy cần chú ý hạ thấp vòi phun, bảo đảm thuốc tiếp xúc được với rầy ở dưới bẹ và gốc lúa; đối với những diện tích mật độ rầy cao phải thường xuyên kiểm tra lại sau phun để có biện pháp xử lý tiếp theo.

Khi phun thuốc cần thực hiện đúng nguyên tắc “4 đúng”: đúng thuốc, đúng lúc, đúng liều lượng và đúng cách; bảo đảm an toàn cho người phun, môi trường và nông sản; thực hiện nghiêm thời gian cách ly.

Đối với những ruộng có mật độ rầy cao, sau khi phun cần tiếp tục kiểm tra để đánh giá hiệu quả phòng trừ và xử lý lần tiếp theo khi cần thiết theo hướng dẫn chuyên môn.

Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc hoặc phát hiện sâu bệnh gây hại với mật độ cao, đề nghị các thôn và hộ dân thông tin kịp thời về Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã để được kiểm tra và hướng dẫn biện pháp xử lý./.

Nơi nhận:

Gửi bản điện tử:

- CT, PCT UBND xã (B/c);
- Phòng KT (Đ/biết);
- Như kính gửi (T/hiện);
- *Gửi bản giấy:*
- Các trưởng thôn;
- Tuyên truyền trên loa phát thanh;
- Lưu: VT, Baynx.

Q.GIÁM ĐỐC



Lục Trường Giang