

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
TỈNH THÁI NGUYÊN
**CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ
BẢO VỆ THỰC VẬT**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 1323/CCTTBVTV-KDTVND
V/v hướng dẫn phòng, trừ bệnh thán thư hại
cây hồng không hạt

Thái Nguyên, ngày 21 tháng 8 năm 2026

Kính gửi: UBND xã Nghiên Loan

Theo đề nghị của UBND xã Nghiên Loan tại công văn số 1668/UBND-KT ngày 14/8/2026 về việc đề nghị hỗ trợ nghiên cứu nguyên nhân và hướng dẫn giải pháp phòng, chống sâu bệnh gây rụng quả trên cây hồng không hạt.

Chi cục Trồng trọt và BVTV đã cử cán bộ kỹ thuật phối hợp với UBND xã Nghiên Loan kiểm tra tình hình sâu bệnh trên một số diện tích trồng cây hồng không hạt tại thôn Khuổi Ún thuộc xã Nghiên Loan. Kết quả kiểm tra cụ thể như sau:

Diện tích trồng cây hồng không hạt tại thôn Khuổi Ún khoảng 13,05 ha trong đó có 05 ha cây hồng không hạt giai đoạn phát triển quả (Diện tích đoàn đi kiểm tra được) đang bị bệnh hại trên lá và quả; căn cứ vào triệu chứng bệnh và tình hình phát sinh gây hại xác định cây đang bị bệnh thán thư do nấm gây nên, tỷ lệ bệnh cục bộ 20% lá, quả; bệnh gây rụng quả rải rác. Ngoài ra trên vườn còn xuất hiện một số đối tượng sâu bệnh hại như bệnh đốm lá, rệp sáp ... gây hại nhẹ, rải rác (*Biên bản làm việc kèm theo công văn này*).

Dự báo thời gian tới, thời tiết tiếp tục có nhiều đợt mưa, riêng khu vực xã Nghiên Loan thường xuyên có sương vào ban đêm và sáng sớm, độ ẩm không khí cao là điều kiện thuận lợi cho bệnh thán thư tiếp tục phát triển và gây hại mạnh.

Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do bệnh thán thư cũng như các đối tượng sâu bệnh khác gây ra trên cây hồng không hạt, Chi cục Trồng trọt và BVTV đề nghị UBND xã Nghiên Loan:

- Chỉ đạo phòng chuyên môn phối hợp với các hộ trồng cây hồng không hạt trong xã kiểm tra, đánh giá tình hình sâu bệnh hại trên diện rộng để phát hiện và hướng dẫn phòng trừ kịp thời.

- Hướng dẫn nông dân chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại trên cây hồng theo “Quy trình phòng trừ tổng hợp sâu, bệnh hại chính trên cây hồng không hạt Bắc Kạn (*Quy trình kèm theo công văn này*)

- Đối với diện tích đang bị bệnh thán thư gây hại:

Thu gom quả rụng mang ra xa vườn tiêu hủy, vệ sinh sạch sẽ vườn đồi.

Sử dụng thuốc có các hoạt chất sau để phun trừ: Metiram+ pyraclostrobin (Cabrio Top 600WG, pha 50-60g/bình 16 lít), Difenoconazole (Score 250EC, pha 20ml/bình 20 lít), Azoxystrobin+ Difenoconazole và Tricyclazole (Athuoc Top

480SC, pha 10ml/bình 20 lít), Azoxystrobin+ Hexaconazole (Camilo 150SC, pha 40ml/bình 25 lít), propineb (Tadashi 700WP, pha 50-60g/bình 16 lít), liều lượng pha theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

- Đối với những diện tích, khu vực hằng năm thường xuyên xuất hiện bệnh thán thư gây hại, cần tập trung chỉ đạo người dân thực hiện các biện pháp phòng bệnh như sau:

Bón đủ phân, bón phân cân đối, chăm sóc theo quy trình hướng dẫn.

Thường xuyên vệ sinh vườn cây. Sau khi cây đậu quả, vào tháng 4-5 tỉa bớt những cành yếu, cành không mang quả, đặc biệt là những cành nằm ngang vuông góc với thân, những cành uốn cong xuống phía dưới đường nằm ngang vuông góc với thân, để tạo thông thoáng cho cây và vườn.

Theo dõi, quản lý tốt các đợt lộc hè, lộc thu để giảm nguồn bệnh.

Phun phòng bệnh bằng thuốc sinh học từ vi khuẩn *Bacillus subtilis* (Bio Bac 50WP, pha 75g/bình 25 lít), Quaternary ammonium salt (Physan 20SL, pha 16ml/bình 16 lít), xạ khuẩn *Streptomyces lydicus* (Acti No vate 1SP, pha 0,5g/bình 8 lít) liều lượng pha theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

- Lưu ý:

Những diện tích bị hại nặng cần phun 2-3 lần cách nhau 7-10 ngày.

Dừng phun thuốc trước khi thu hoạch 2-3 tuần.

Kỹ thuật phun: Giai đoạn đầu khi cây mới nảy lộc ra lá non, hướng vòi phun từ trên xuống dưới để thuốc trải đều trên mặt lá và các cành non của cây. Khi cây đã hình thành quả, lá to nhiều, xum xuê nên đưa vòi phun vào trong tán lá, ngửa hoặc để ngang vòi phun cho hạt thuốc tiếp xúc được nhiều nhất với cành và quả.

Dụng cụ phun rải: Tốt nhất là sử dụng bình phun có động cơ. Với những cây cao, nhiều năm tuổi nên sử dụng máy phun áp suất cao để giảm công lao động, nâng cao hiệu quả phòng chống bệnh.

Phun thuốc theo hướng dẫn trên nhãn thuốc và tuân thủ “kỹ thuật 4 đúng”.

Với nội dung trên, đề nghị UBND xã Nghiên Loan phối hợp thực hiện. /

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Nông nghiệp và Môi trường (Báo cáo);
- Lãnh đạo Chi cục;
- UBND các xã Đồng Phúc, Nam Cường, Quảng Bạch, Chợ Rã;
- Phòng Trồng trọt và BVTV;
- Lưu: VT, KDTVND, Hănght.

**KT. CHI CỤC TRƯỞNG
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG**



Hoàng Thanh Bình