

UBND XÃ QUẢNG BẠCH
TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 86/TTDVTH-NN

Quảng Bạch, ngày 20 tháng 10 năm 2026

V/v hướng dẫn thực hiện các biện pháp
 phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Kính gửi: Các ông, bà trưởng thôn xã Quảng Bạch.

Ngày 19/10/2026 theo thông tin báo cáo trưởng thôn Tân Lập, hộ Bà Lèng Thị Bờm - thôn Tân Lập xã Quảng Bạch có nuôi 6 lợn (1lợn nái, 5con lợn thịt); 5 con lợn thịt bị ốm qua kiểm tra triệu chứng ban đầu nghi mắc bệnh Dịch tả.

Để triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi nhằm ngăn chặn và khống chế không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng. Trung tâm Dịch vụ tổng hợp hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, cụ thể như sau:

1. Thực hiện vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại, môi trường chăn nuôi thường xuyên bằng các loại thuốc sát trùng hoặc vôi bột, cụ thể:

+ Các hộ chăn nuôi lợn trong thôn áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh như vệ sinh, khử trùng tiêu độc liên tục 01 lần/ngày trong vòng 1 tuần đầu tiên; 03 lần/tuần trong 2-3 tuần tiếp theo; Lượng thuốc sát trùng cần sử dụng 2lít/100m²/tháng (*mỗi lần phun pha 125ml thuốc với 33 lít nước*).

+ Tại các thôn lân cận, khử trùng tiêu độc với tần suất 01 lần/tuần liên tục trong vòng 1 tháng; Lượng thuốc sát trùng cần sử dụng 0,5lít/100m²/tháng (*mỗi lần phun pha 125ml thuốc với 33 lít nước*).

Đối với vôi bột: Lượng vôi bột cần sử dụng để rắc bề mặt chuồng trại và khu vực chăn nuôi tính cho 100 m² cần 15-20 kg, lưu ý không rắc vôi bột lên bề mặt chuồng đang nuôi lợn sẽ gây bỏng cho lợn.

- Hướng dẫn các hộ chăn nuôi áp dụng các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi lợn, cụ thể:

+ Về chuồng trại: Phải dễ thực hiện các biện pháp vệ sinh, sát trùng, tiêu độc; lổ ra vào phải có hố khử trùng; có ô chuồng nuôi cách ly; có khu vực thu gom và xử lý chất thải; mỗi ô chuồng có đường thoát nước thải riêng ra đường thoát nước chung, đường thoát nước thải chung từ chuồng nuôi đến khu xử lý chất thải đảm bảo kín; không sử dụng chung dụng cụ chăn nuôi giữa các chuồng.

+ Về con giống: Lợn nhập về nuôi phải có nguồn gốc rõ ràng, khỏe mạnh. Đối với lợn nhập từ ngoài xã phải có giấy kiểm dịch. Trước khi nhập đàn, nuôi cách ly ít nhất 2 tuần.

+ Về thức ăn: Sử dụng thức ăn có nguồn gốc rõ ràng, không bị hỏng, mốc, đảm bảo chất lượng và an toàn; đối với thức ăn tận dụng phải được nấu chín; nên bổ sung chế phẩm sinh học trong thức ăn để tăng khả năng tiêu hóa, sức đề kháng.

+ Vệ sinh máng ăn, máng uống hàng ngày; sau mỗi đợt nuôi phải vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng, dụng cụ chăn nuôi và để trống chuồng ít nhất 7 ngày trước khi đưa lợn vào nuôi; trong trường hợp chuồng bị dịch, nếu tái đàn phải để trống chuồng ít nhất 30 ngày.

2. Tuyên truyền nhân dân chủ động trong công tác khai báo, phát hiện bệnh, khi lợn có dấu hiệu bất thường, nghi mắc bệnh Dịch tả lợn châu Phi cần báo ngay cho trưởng thôn, với đơn vị chuyên môn đến kiểm tra, xác minh, hướng dẫn xử lý đúng theo quy định.

Trên đây là Hướng dẫn biện pháp phòng, chống dịch bệnh của Trung tâm Dịch vụ tổng hợp, đề nghị các Ông (bà) Trưởng thôn tuyên truyền triển khai đến bà con trong thôn được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

Gửi bản điện tử:

- Như trên; (T/hiện)
- LĐ UBND huyện; (B/cáo)
- Phòng kinh tế (P/h);
- Lưu: VT.

Q. GIÁM ĐỐC



Vy Văn Du