

UBND XÃ BÌNH THÀNH
TRUNG TÂM
DỊCH VỤ TỔNG HỢP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 25 /HD-TTĐVTH
V/v hướng dẫn phòng trừ sinh vật
gây hại lúa vụ Mùa năm 2026

Bình Thành, ngày 14 tháng 8 năm 2026

Kính gửi: 14 Ông (bà) Trưởng xóm trên địa bàn xã

Thực hiện Công văn số 1248/CCTTBVTV-TTBVTV ngày 10/8/2026 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Thái Nguyên về việc hướng dẫn phòng trừ sinh vật gây hại lúa vụ Mùa năm 2026;

Hiện nay, lúa mùa sớm đang giai đoạn đứng cái – làm đòng, lúa mùa trung đang giai đoạn cuối đẻ nhánh – đứng cái, lúa mùa muộn đang giai đoạn đẻ nhánh.

Qua kết quả điều tra của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật: trưởng thành sâu đục thân đã xuất hiện, dự báo sâu non bắt đầu nở từ ngày 15/8 đến ngày 25/8 sẽ gây bông bạc trên trà lúa mùa sớm trổ từ 15/8, gây ung đòng trên trà lúa mùa trung. Sâu cuốn lá nhỏ hại chủ yếu trên trà mùa sớm, mùa trung với mật độ nơi cao 10-15 con/m², cục bộ 28 con/m²; trên trà lúa mùa sớm dự báo sâu non sâu cuốn lá bắt đầu nở từ ngày 12/8 đến ngày 20/8; trên trà lúa mùa trung dự báo trưởng thành xuất hiện từ ngày 22/8 đến ngày 28/8, sâu non nở từ ngày 25/8 đến 31/8. Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn tỷ lệ bệnh trung bình 2-3%, nơi cao 10%, cục bộ 30 - 50% lá bị hại. Bệnh đạo ôn lá gây hại cục bộ trên các giống nhiễm như nếp, J02, C70... tỷ lệ bệnh trung bình 2%, nơi cao 7%, cục bộ 30% lá bị hại. Bệnh khô vằn tỷ lệ bệnh trung bình 2-5%, nơi cao 10-20% đánh bị hại.

Thời tiết tỉnh Thái Nguyên trong tháng 8 được dự báo xuất hiện khoảng 01-02 đợt nắng nóng, 02-03 đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng, có thể xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, ngập úng, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Với giai đoạn sinh trưởng, phát triển của cây lúa và diễn biến thời tiết trong thời gian tới là điều kiện thuận lợi cho sâu bệnh tiếp tục phát sinh và gây hại trên diện rộng. Để chủ động trong công tác phát hiện, phòng trừ và hạn chế thấp nhất thiệt hại của sinh vật gây hại cây lúa vụ Mùa.

Để chủ động trong công tác phát hiện, phòng trừ và hạn chế thấp nhất thiệt hại của sinh vật gây hại trên lúa Mùa, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp đề nghị trưởng các xóm phối hợp thông tin và hướng dẫn đến người dân các biện pháp kỹ thuật cụ thể như sau:

*** Đối với sâu cuốn lá**

Theo dõi chặt chẽ diễn biến, xác định thời điểm sâu non nở:

- Giai đoạn lúa đứng cái làm đòng, phun thuốc trừ sâu nếu thấy mật độ sâu non từ 10 con/m² trở lên, những ruộng có mật độ sâu cao trên 20 con/m² phải phun kép 2 lần cách nhau từ 4 - 5 ngày.

- Giai đoạn lúa đẻ nhánh phun thuốc trừ sâu nếu thấy mật độ sâu non từ 50 con/m² trở lên, những ruộng có mật độ sâu cao trên 100 con/m² phải phun kép 2 lần cách nhau từ 4 - 5 ngày.

Sử dụng một trong các thuốc trừ sâu cuốn lá hại lúa được đăng ký trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam ví dụ như: Clever 150SC, 300WG, Virtako® 40WG, Patox 95SP, Comda gold 5WG, Match® 050 EC, ...

*** Đối với sâu đục thân**

- Theo dõi diễn biến của trưởng thành, mật độ ổ trứng và thời điểm sâu non nở đặc biệt trên những ruộng đang trong giai đoạn đứng cái - làm đòng - trổ bông.

- Sử dụng thuốc phun trừ sâu đục thân cho những ruộng lúa có mật độ ổ trứng trên 0,3 ổ/m² (3 ổ/10m²), thời điểm phun khi sâu non mới nở, những ruộng có mật độ ổ trứng cao trên 1 ổ/m² (10 ổ/10 m²) cần tiến hành phun kép 2 lần cách nhau từ 4 - 5 ngày.

- Sử dụng một trong các thuốc trừ sâu đục thân hại lúa được đăng ký trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam ví dụ như: Virtako® 40WG, Gà nòi 95SP; Patox 95SP, Aremec 45EC; Shepatin 90EC; Neretox 18 SL, 95WP,

*** Đối với Bệnh bạc lá, bệnh đốm sọc vi khuẩn**

Bệnh tiếp tục phát sinh và gây hại mạnh sau những trận mưa giông. Khi xuất hiện bệnh, dừng bón phân đạm, không phun các chất kích thích sinh trưởng hoặc phân bón lá và luôn giữ đủ nước trong ruộng; phun phòng, trừ bệnh bằng một trong các loại thuốc như: Kasumin 2SL, Xantocin 40WP, Sansai 200 WP, Linacin 40SL, Totan 200WP, Ychatot 900SP, Xanthomix 20 WP.... Sau khi phun thuốc 5 - 7 ngày, nếu bệnh chưa dừng phải tiến hành phun lại.

*** Đối với bệnh đạo ôn lá**

- Phòng bệnh: Thực hiện bón phân cân đối giữa đạm, lân và kali, kết hợp làm cỏ, giữ nước hợp lý, đảm bảo cho cây lúa sinh trưởng phát triển tốt.

- Trừ bệnh: Với những ruộng bệnh đã xuất hiện bệnh, thực hiện dừng bón phân đạm, không phun các chất kích thích sinh trưởng và phân bón lá, giữ đủ nước trong ruộng, tranh thủ thời tiết thuận lợi để phun trừ bằng các loại thuốc đặc hiệu khi bệnh mới xuất hiện. Những ruộng bệnh gây hại nặng phải phun kép 2 lần cách nhau từ 5 - 7 ngày. Sử dụng các loại thuốc đặc hiệu có trong danh mục thuốc BVTV được phép lưu hành tại Việt Nam để phun trừ như: Amistar Top® 325SC; Daconil 75WP; Fuji One 40EC, 40WP, Katana 20SC; Fu-army 30WP, 40EC...

*** Đối với bệnh khô vằn**

Áp dụng tổng hợp các biện pháp chăm sóc cây khỏe, thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, kịp thời phát hiện ổ bệnh, phun thuốc trừ bệnh bằng một trong các loại thuốc trừ bệnh khô vằn hại lúa được đăng ký trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam ví dụ như: Saizole 5SC, Validacin 5SL; Tilt Super® 300EC; Anvil® 5SC.... Sau khi phun thuốc 5-7 ngày, kiểm tra lại, nếu bệnh chưa dừng phải phun lại.

Ngoài ra, cần chú ý theo dõi và phòng trừ: chuột, bọ xít dài, bệnh hoa cúc, bệnh đen lép hạt... để chủ động áp dụng các biện pháp phòng trừ kịp thời; Hướng dẫn nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc “4 đúng”, đảm bảo trang bị đầy đủ bảo hộ lao động khi tiếp xúc với thuốc; thu gom và xử lý an toàn, đúng quy định với vỏ bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng.

Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Bình Thành đề nghị trường các xóm phối hợp tăng cường kiểm tra đồng ruộng, theo dõi sự phát triển của sâu bệnh. Đề chủ động triển khai thực hiện các biện pháp phòng trừ kịp thời./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Phòng Kinh tế;
- Lưu TTDVTH.

PHÓ GIÁM ĐỐC



Mã Thanh Liêm