

Số: 04 /TTDVTH

Bình Thành, ngày 28 tháng 08 năm 2025

V/v hướng dẫn phòng trừ sâu
bệnh hại lúa vụ Mùa

Kính gửi: Các ông (bà) Trưởng xóm

Hiện nay, lúa mùa đang trong giai đoạn đẻ nhánh- đẻ nhánh rộ. Thời tiết những ngày qua trời mưa nắng thất thường, ẩm độ cao dự báo thời gian tới tiếp tục nóng ẩm. Đây là điều kiện thuận lợi cho sâu bệnh phát triển, phát sinh và gây hại trên diện rộng nếu không được phòng trừ kịp thời.

Để hạn chế sự ảnh hưởng, thiệt hại do sâu bệnh hại trên cây lúa, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp hướng dẫn các biện pháp phòng trừ như sau:

1. Rầy nâu, rầy lưng trắng:

Mật độ trung bình 300-500 con/m². Dự báo trong thời gian tới mật độ rầy sẽ tiếp tục tăng cao, gây hại mạnh.

Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng phát hiện kịp thời ổ rầy, phun thuốc trừ rầy, trong ruộng có mật độ từ 1.000-1.500 con/m²(40 con/ khóm) thì sử dụng một trong các loại thuốc có trong danh mục đăng ký trừ rầy:

Giai đoạn này nên sử dụng thuốc có tác dụng lưu dẫn như: Actara 25WG, Miretoc-HB 300WP, Midan 10WP, Chetsduc 700WG...

2. Sâu cuốn lá nhỏ

Trưởng thành sâu cuốn lá nhỏ nở rộ từ 20-30/08, dự báo sâu non nở rộ từ ngày 5/9 – 15/9 gây hại trên các trà lúa mùa trung.

Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để sớm phát hiện và kịp thời xử lý. Đặc biệt chú ý trên các giống lúa như: J02, Khang dân, lúa thơm,....

Theo dõi chặt chẽ diễn biến, xác định thời điểm sâu non nở, phun thuốc trừ sâu nếu mật độ sâu từ 15-20 con/m² trở lên, với ruộng có mật độ sâu cao phải phun kép 2 lần cách nhau 4-5 ngày.

Sử dụng một trong các loại thuốc trừ sâu cuốn lá sau: thuốc trừ sâu USA 850, Scorpion, Gà nòi 95SP, Virtako40WG, Pattox95Sp, Aremec 45EC ...

3. Bệnh khô vằn:

- Đang gây hại với tỷ lệ trung bình 3-5%, nơi cao 10% danh. Dự báo thời gian tới bệnh sẽ tiếp tục gây hại trên diện rộng, với tỷ lệ bệnh cao.

