

Số: /CV-TTĐVTH

An Khánh, ngày tháng 8 năm 2026

“V/v hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh hại trên
cây chè”

Kính gửi: Các ông (bà) trưởng xóm

Trong mấy ngày qua diễn biến thời tiết thất thường, nắng nóng xen kẽ mưa ẩm đã tạo điều kiện cho các đối tượng sâu bệnh hại phát sinh, phát triển và gây hại trên các loại cây trồng. Trong đó các đối tượng như bọ cánh tơ, rầy xanh và các loại nấm bệnh đang phát sinh và gây hại trên cây chè. Đặc biệt với điều kiện thời tiết nắng nóng như hiện nay rất thuận lợi cho bọ cánh tơ, rầy xanh phát triển và gây hại mạnh, có thể gây cháy cục bộ ở một số nương chè đang phát triển búp nếu không được kiểm tra, phát hiện và phòng trừ kịp thời.

Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do sâu bệnh hại gây ra. UBND xã hướng dẫn một số biện pháp kỹ thuật phòng trừ như sau:

1. Chăm sóc:

- Bón phân cân đối giữa đạm, lân, kali và phân hữu cơ đầy đủ, đúng quy trình kỹ thuật.
- Những nương chè rậm rạp thì phát quang, tỉa cành và làm sạch cỏ dại để cây chè sinh trưởng tốt, hạn chế nấm bệnh;
- Tủ gốc giữ ẩm hoặc tưới nước phun mưa để hạn chế bọ cánh tơ phát triển.
- Thường xuyên kiểm tra nương chè để sớm phát hiện bọ cánh tơ, rầy xanh, nấm bệnh phát sinh gây hại. Nếu thấy bọ cánh tơ, rầy xanh mới nở có mật độ cao, vết bệnh mới xuất hiện thì tiến hành phun phòng trừ ngay.

2. Biện pháp phòng trừ:

- Đối với bọ cánh tơ, rầy xanh:

- + Hái chạy đối với những nương chè sắp được thu hái.
- + Sử dụng thuốc hóa học với những nương chè búp còn nhỏ. Có thể sử dụng một trong số các loại thuốc như: **BP DyGan 5.4 EC (di gan), DETECT (đét tét) 50 WP, catex 3.6 EC (ca tét), Trusach 2.5EC (tru sách)**... để phun trừ.

- Đối với các loại bệnh do nấm như: Bệnh đốm nâu, thối búp

- + Thăm vườn thường xuyên, phát hiện sớm vết bệnh; Ngắt bỏ các lá chè bị bệnh để hạn chế lây lan nấm bệnh trong từng dãy, từng nương chè; tiêu hủy sạch sẽ tàn dư các bộ phận nhiễm bệnh để tránh lây truyền nấm bệnh cho các cây khác.

+ Dùng một trong các loại thuốc gốc đồng như Daconil 75WP, Stop 15 WP, Kaido 50WWP, Amtech 100EW,...để phun trừ bệnh.

Lưu ý: Pha và phun theo hướng dẫn trên bao bì nông dược; nên phun thuốc vào chiều tối mát). Sau khi phun từ 3 – 5 ngày kiểm tra lại nương chè nếu thấy mật độ bọ cánh tơ, rầy xanh còn cao thì phải phun lại lần 2 nhưng phải đảm bảo thời gian cách ly của thuốc.

- Ngoài ra trên cây chè còn xuất hiện các đối tượng gây hại khác như bọ xít muỗi, nhện đỏ, bệnh đốm mắt cua, đốm xám. Đề nghị nhân dân thường xuyên thăm nương chè kiểm tra để kịp thời xử lý.

Trên đây là hướng dẫn của Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã An Khánh đề nghị các ông (bà) trưởng xóm thông báo trên loa phát thanh 2-3 lần/ngày (sáng, trưa, chiều tối) để bà con biết và thực hiện kịp thời hiệu quả./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND xã (b/c);
- Phòng XD, NN & MT (T/b);
- Lãnh đạo Trung tâm;
- Lưu: VT- TTDVTH.

GIÁM ĐỐC

Phạm Lê Nam