

hiệu có trong danh mục thuốc BVTV được phép lưu hành tại Việt Nam, ví dụ như: Amistar Top® 325SC, Filia 525SE, Beam 75WP, Fuji-One 40EC, Katana 20SC, Fu-army 30WP, Lúa vàng 20WP, Fuan 40EC, Bionite WP,...

Những ruộng bị bệnh gây hại nặng phải phun kép 2 lần cách nhau từ 5 - 7 ngày.

Những ruộng đã nhiễm bệnh đạo ôn lá hoặc những ruộng cây giống nhiễm, đến thời kỳ lúa trổ bông nếu gặp điều kiện thời tiết có mưa ẩm có thể bị nhiễm bệnh đạo ôn cổ bông (làm bông bạc hoặc gãy gục), do vậy cần phun phòng bệnh bằng cách: phun kép 2 lần với các loại thuốc nêu trên, lần 1 khi lúa trổ lác đác, lần 2 khi lúa trổ xong.

Ngoài ra, cần chú ý phòng trừ rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh bạc lá, bệnh đốm sọc vi khuẩn...

3. Phối hợp với các cơ quan truyền thông, thông tin kịp thời về tình hình sinh vật gây hại cây trồng và các đối tượng sinh vật gây hại chính tại các khu vực cụ thể để nông dân biết và chủ động các biện pháp phòng chống kịp thời, hiệu quả.

4. Hướng dẫn nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc “4 đúng”, ưu tiên sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học; đảm bảo trang bị đầy đủ bảo hộ lao động khi tiếp xúc với thuốc; thu gom và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng an toàn, đúng quy định.

5. Thường xuyên cập nhật, báo cáo tình hình phát sinh và công tác phòng trừ sâu, bệnh hại cây lúa (trong đó có bệnh đạo ôn) về Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật để phối hợp xử lý.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đề nghị UBND các xã quan tâm phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục Trồng trọt và BVTV;
- Trung tâm Trồng trọt và BVTV;
- Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- Trung tâm Khuyến nông và Môi trường;
- Các chi nhánh Trung tâm KN&MT khu vực X, XII, XIII, XIV, XV, XVII;
- Lãnh đạo Chi cục;
- Phòng, trạm thuộc Chi cục;
- Lưu: VT, TT BVTV.

**KT. CHI CỤC TRƯỞNG
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG**

Hoàng Thanh Bình