

Số: /HD-CCTT&BVTV

Thái Nguyên, ngày tháng 3 năm 2024

HƯỚNG DẪN Phòng trừ bệnh hại cây trồng

Hiện nay cây lúa giai đoạn đẻ nhánh - đẻ nhánh rộ - cuối đẻ nhánh; cây chè kinh doanh giai đoạn phát triển búp, chè giống giai đoạn nảy mầm; cây vải, nhãn giai đoạn phát triển lộc, nụ hoa; cây bưởi, cam quýt phát triển lộc, hoa, quả non.

Kết quả điều tra đồng ruộng cho thấy, hiện nay một số đối tượng dịch hại gây hại trên cây trồng như bệnh đạo ôn xuất hiện gây hại lúa (J02, nếp...) với tỷ lệ bệnh trung bình 0,5 - 0,6%, nơi cao 1-3%, cá biệt 10-15% lá bị bệnh; Bệnh phòng lá xuất hiện gây hại trên chè với tỷ lệ bệnh trung bình 1 - 2%, nơi cao 5-10% lá bị bệnh. Bệnh sương mai, thán thư gây hại cục bộ trên nhãn, vải.

Dự báo trong thời gian tới, thời tiết tiếp tục mưa xen kẽ, ẩm độ không khí cao trên 85%, rét nhẹ. Đây là điều kiện rất thuận lợi cho bệnh phát sinh, phát triển và gây hại trên diện rộng nếu không được phòng trừ kịp thời. Đặc biệt là bệnh đạo ôn trên lúa, phòng lá trên chè, sương mai, thán thư trên nhãn, vải.

Để hạn chế thiệt hại thấp nhất do bệnh gây ra, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật hướng dẫn một số biện pháp kỹ thuật phòng trừ như sau:

1. Đối với bệnh Đạo ôn hại lúa

- Phòng bệnh: Thực hiện bón phân cân đối giữa đạm, lân và kali, kết hợp làm cỏ, giữ nước hợp lý, đảm bảo cho cây lúa sinh trưởng phát triển tốt.

- Trừ bệnh: Với những ruộng bệnh đã xuất hiện, thực hiện dừng bón phân đạm, không phun các chất kích thích sinh trưởng và phân bón lá, giữ đủ nước trong ruộng, tranh thủ thời tiết thuận lợi để phun trừ bằng các loại thuốc đặc hiệu khi bệnh mới xuất hiện. Những ruộng bệnh gây hại nặng phải phun kép 2 lần cách nhau từ 5 - 7 ngày. Sử dụng các loại thuốc đặc hiệu có trong danh mục thuốc BVTV được phép lưu hành tại Việt Nam để phun trừ ví dụ như: Amistar Top® 325SC; Daconil 75WP; Fuji-One 40EC, 40WP, Katana 20SC; Fu-army 30WP, 40EC; Lúa vàng 20WP; Fuan 40EC ...

Ngoài ra cần theo dõi diễn biến các đối tượng sâu cuốn lá, sâu đục thân, bệnh khô vằn ...gây hại trên lúa Xuân.

2. Đối với bệnh Phòng lá hại chè

*** Đối với vườn chè giống, nương chè kinh doanh chưa bị bệnh**

- Vệ sinh sạch sẽ, tạo độ thông thoáng, nhặt hom chết, que, cọc, lá rụng, cắt vết bệnh (trên lá) đem đốt hoặc chôn sâu để tiêu diệt nguồn bệnh (áp dụng đối với vườn ươm). Tỉa bớt cành cây che bóng, làm sạch cỏ dại tạo độ thông thoáng trong nương chè (đối với vườn chè kinh doanh).

- Bón phân cân đối, tránh bón quá nhiều phân đạm và bón phân đạm đơn. Cần bón bổ sung phân Kali để tăng sức chống bệnh cho cây chè.

*** Đối với vườn chè giống, nương chè kinh doanh đã bị bệnh Phòng lá**

Ngừng bón phân hóa học, thực hiện các biện pháp thủ công như hái bỏ những lá, búp chè bị bệnh, đem đốt hoặc vùi sâu để tiêu diệt nguồn bệnh, sau đó xử lý bằng một trong các loại thuốc bảo vệ thực vật có trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép lưu hành tại Việt Nam để phun trừ ví dụ như: Manage 5WP, Stifano 5.5SL, Starsuper 20WP; Yomisuper 23WP...

3. Đối với bệnh sương mai, thán thư hại nhãn, vải

Chủ động theo dõi những vườn vải, nhãn đang trong giai đoạn phát triển lộc, nụ hoa, quả non, phát hiện kịp thời bệnh sương mai, thán thư hại vải, nhãn, tia bớt các chùm hoa quá dày, các nhánh hoa ở phần đầu và phần cuối chùm hoa, hướng dẫn nông dân phun phòng bệnh trong điều kiện thời tiết thuận lợi cho bệnh phát triển (trời mưa ẩm). Sử dụng các loại thuốc trừ bệnh được đăng ký trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam ví dụ như: Đối với bệnh thán thư sử dụng thuốc như: Manage 5WP; Daconil 500SC; Lilacter 0.3 SL; Mdancozeb 640 WP; Stonegold 22WP.... Bệnh sương mai sử dụng thuốc như Antracol 70WP; Arygreen 75 WP, 500SC; Insuran 50WG; Lilacter 0.3 SL...

Ngoài ra cần chú ý theo dõi bệnh phấn trắng hại cây keo; bệnh loét vi khuẩn hại trên nhóm cây có múi.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật báo cáo Sở nông nghiệp và PTNT, đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Kinh tế, Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, UBND các xã phường, thị trấn tăng cường công tác điều tra phát hiện, theo dõi sự phát triển của diễn biến dịch hại trên cây trồng, chủ động tham mưu các biện pháp chỉ đạo phòng trừ kịp thời, không để ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển và năng suất sản lượng cây trồng.

Đề nghị Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Thái Nguyên đưa tin để nông dân biết và phòng trừ bệnh kịp thời. Các Công ty, đại lý vật tư nông nghiệp chuẩn bị đầy đủ thuốc bảo vệ thực vật đảm bảo chất lượng, số lượng và chủng loại để phục vụ nông dân phòng trừ sâu bệnh hại./.

Nơi nhận:

- Sở Nông nghiệp & PTNT;
- Cục BVTV; Cục Trồng trọt;
- TTBBTV phía Bắc;
- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo TN;
- Lãnh đạo Chi cục;
- Phòng NN&PTNT các huyện
- Phòng Kinh tế các thành phố;
- Trung tâm DVNN các huyện, thành phố;
- Các Công ty vật tư BVTV ở Thái Nguyên;
- Lưu: VT, TTBBTV.

CHI CỤC TRỒNG

Nguyễn Tá