

THÔNG BÁO

Phòng trừ rầy nâu, rầy lưng trắng gây hại cây lúa cuối vụ Xuân 2026

Hiện nay cây lúa xuân sớm đang giai đoạn chắc xanh - chín, lúa xuân muộn giai đoạn làm đòng - trổ. Thời tiết trong những ngày qua nắng nóng, xen kẽ có mưa rất thuận lợi cho một số đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại. Qua kết quả điều tra đồng ruộng cho thấy: Rầy nâu, rầy lưng trắng mật độ cao 1.500 - 2.000 con/m², cục bộ 3.000 con/m² (tuổi non - trưởng thành). Dự báo trong những ngày tới rầy non tiếp tục nở, mật độ rầy sẽ tăng nhanh gây cháy chòm cục bộ và có thể gây cháy lúa trên diện rộng nếu không được phòng trừ kịp thời.

Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do sâu, bệnh gây ra, ảnh hưởng tới năng suất cây lúa. Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh Thái Nguyên đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, phường chỉ đạo phòng chuyên môn, Trung tâm dịch vụ tổng hợp thực hiện một số nội dung như sau:

1. Đối với rầy nâu, rầy lưng trắng

- Tăng cường kiểm tra đồng ruộng để phát hiện ổ rầy, phun thuốc trừ rầy với những ruộng lúa có mật độ 20-50 con/khóm (1.000 - 2.500 con/m²). Sau khi phun thuốc thực hiện đúng thời gian cách ly để đảm bảo an toàn cho nông sản.

+ Đối với những diện tích lúa đang giai đoạn làm đòng - trổ, ruộng chủ động nước nên sử dụng một trong các loại thuốc có tác dụng lưu dẫn như: Actara® 25WG, Chess® 50WG, Sutin 5EC, Chersieu 50WG; Sachray 200WP...

- Đối với những ruộng khô hạn và lúa từ giai đoạn chắc xanh đến chín, phun trừ khi mật độ rầy khoảng 1.000 con/m² trở lên bằng một trong các loại thuốc có tác dụng tiếp xúc như: Bassa 50EC, Applaud 25SC, 25WP, Sieuray 250WP, Vibasa 50EC... (Yêu cầu phải rẽ lúa thành luống, mỗi luống rộng từ 0,6 - 0,8m, hạ thấp vòi phun để thuốc tiếp xúc trực tiếp với rầy ở dưới bẹ và gốc lúa). Những ruộng có mật độ rầy cao phải phun kép 2 lần, cách nhau từ 5 - 7 ngày. Dùng luân phiên các loại thuốc để tránh tính kháng thuốc của rầy.

2. Đối với các đối tượng sâu bệnh hại khác

Thực hiện theo Công văn tăng cường phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng số 554/CCTTBVTV-TTBVTV ngày 24/4/2026 của Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh Thái Nguyên.

Ngoài ra, chú ý theo dõi mức độ phát sinh, gây hại của bọ xít dài, chuột, bệnh đen lép hạt, bệnh hoa cúc... để chủ động áp dụng các biện pháp phòng trừ kịp thời;

hướng dẫn người dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc 4 đúng, đảm bảo tuân thủ thời gian cách ly, nồng độ, liều lượng theo hướng dẫn trên bao bì...

Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh Thái Nguyên đề nghị UBND các xã, phường chỉ đạo cán bộ chuyên môn tăng cường công tác điều tra phát hiện, theo dõi sự phát sinh, phát triển và diễn biến dịch hại, chủ động trong công tác chỉ đạo phòng trừ, không để ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển và năng suất, sản lượng cây trồng.

Đề nghị Báo và Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên phối hợp đưa tin bài để khuyến cáo nông dân phòng trừ sâu bệnh hiệu quả. Các Doanh nghiệp, đại lý kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật cung ứng kịp thời đầy đủ các loại thuốc BVTV đảm bảo chất lượng và chủng loại để phục vụ nông dân phòng trừ sâu bệnh hại đạt hiệu quả./.

Nơi nhận:

- UBND các xã, phường;
- Cục Trồng trọt và BVTV;
- Trung tâm Trồng trọt và BVTV phía Bắc;
- Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- Báo và Phát thanh TH Thái Nguyên;
- Trung tâm Khuyến nông và Môi trường;
- Lãnh đạo Chi cục;
- Phòng, trạm thuộc Chi cục;
- Các Công ty, đại lý VTNN tại Thái Nguyên;
- Lưu: VT, TTBVTV, Oanhhtk.

**KT. CHI CỤC TRƯỞNG
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG**

Hoàng Thanh Bình