

UBND TỈNH NAM ĐỊNH
SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT

Số: /SNN-CCTTBVTV
V/v Tập trung phòng trừ sâu bệnh trên lúa
Xuân 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nam Định, ngày tháng 5 năm 2022

Kính gửi:

- UBND, phòng Nông nghiệp & PTNT các huyện, phòng Kinh tế thành phố;
- Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp các huyện, thành phố.

Theo báo cáo của Chi cục Trồng trọt & Bảo vệ thực vật và kiểm tra thực tế đồng ruộng cho thấy: Đến ngày 10/5, toàn tỉnh đã phun trừ sâu cuốn lá nhỏ lúa 2 cho 47.454ha lúa, kết hợp trừ bệnh khô vằn cho 61.124ha và trừ rầy cho 16.850ha. Nhìn chung kết quả phòng trừ đạt hiệu quả cao. Tuy nhiên những ngày cuối của cao điểm phòng trừ (06-08/5) có mưa giông, một số hộ nông dân chủ quan cho rằng mật độ sâu thấp nên chưa phòng trừ hoặc phun xong gặp mưa, phun thuốc không theo hướng dẫn của cơ quan chuyên ngành nên mật độ sâu nơi cao (50-100 con/m², cá biệt trên 150 con/m², phổ biến tuổi 2-4 tập trung ở các huyện Nghĩa Hưng, Giao Thủy, ...) gây hại trực tiếp tới bộ lá đồng của cây lúa. Dự báo sâu non sâu cuốn lá nhỏ lúa 3 sẽ nở rộ từ ngày 22-27/5, mật độ sâu phổ biến 20-30 con/m², nơi cao 50-100 con/m², cục bộ >200 con/m²; Phân bố không đồng đều giữa các địa phương, chủ yếu gây hại trên diện tích lúa trổ bông sau ngày 20/5.

Trong thời gian tới, dự kiến từ ngày 13-15/5 sẽ có đợt không khí lạnh hiếm gặp trong 40 năm qua làm nhiệt độ giảm sâu, gây mưa giông xen kẽ và biên độ nhiệt độ chênh lệch ngày đêm lớn là điều kiện thời tiết rất thuận lợi cho sâu bệnh phát sinh, đặc biệt là bệnh đạo ôn cổ bông, đen lép hạt, bạc lá, ... có nguy cơ gây hại nặng trên diện rộng.

Trước tình hình trên, Sở Nông nghiệp & PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố quan tâm chỉ đạo Phòng Nông nghiệp & PTNT, phòng Kinh tế thành phố, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp các huyện, thành phố tập trung thực hiện tốt một số việc sau:

1. Phân công cán bộ chuyên môn phối hợp chặt chẽ với các xã, thị trấn tuyên truyền, đôn đốc các hộ nông dân tăng cường kiểm tra đồng ruộng, lách thời tiết để kịp thời phun thuốc phòng trừ sâu bệnh:

- **Bệnh đạo ôn cổ bông:** Phun phòng bệnh lúc lúa trổ 3-5% số bông (ruộng trổ trước phun trước, ruộng trổ sau phun sau) cho các giống nhiễm như: BC15, TBR225, Khang Dân 18, Q5, Đài thơm 8, Thiên ưu 8, Thái Xuyên 111, Phúc Thái 168, Nếp, ... Sử dụng thuốc có hoạt chất Tricyclazole (Kabim 30WP, Kasai-S 92SC, Flash 75WP, Filia 525SE, Bamy 75WP, Beam 75WP, Belazole 75WP ...); hoạt chất khác (Bump 650WP, Bumrosai 650WP, Bankan 600WP, Mixperfect 525SC, Map Unique 750WP ...). Trường hợp áp lực bệnh cao (thời tiết thuận lợi, nguồn bệnh cao) cần phun lần 2 khi lúa đã trổ hoàn toàn. Ruộng lúa đã trổ không kịp phun thuốc phải phun lại ngay sau khi lúa trổ thoát hoàn toàn. Không nên sử dụng loại thuốc chỉ chứa 1 hoạt chất **Isoprothiolane** để phun phòng bệnh đạo ôn cổ bông do hiệu quả phòng trừ rất thấp.

- **Khẩn trương phun thuốc trừ sâu cuốn lá nhỏ lúa 2** chậm nhất đến ngày 14/5. **Đối với sâu cuốn lá nhỏ lúa 3 phun trừ tập trung từ ngày 22-27/5** (chủ yếu trên diện lúa trổ bông sau ngày 20/5) cho những diện tích có mật độ sâu ≥ 20 con/m² trở lên. Sử dụng thuốc có hoạt chất Indoxacarb (Clever 150SC; 300WG, August 350WG, Sunset 300WG, Obaone 95WG, Ammate® 150EC, Divine 180SC, Indogold 150SC, Ebato 160SC, Abacarb-HB 50EC,...); hoạt chất khác (Takumi 20SC, Map Dona 265EC, Solo 350SC, Match 050 EC, Voliam Targo 063SC,...), kết hợp trừ rầy lưng trắng lúa 2 cho những diện tích còn mật độ rầy ≥ 30 con/khóm (1.000 con/m²).

- **Bệnh đen lép hạt:** Phun phòng bệnh hoặc kết hợp với các thuốc trừ dịch hại khác khi lúa trổ 1-5% số bông. Sử dụng thuốc có hoạt chất Difenconazole + Propiconazole (Tilt super 300EC, Tstil super 300EC, Superone 300EC, Goltis super 300 EC,...); hoạt chất Azoxystrobin + Difenconazole (Help 400SC, Amistar top 325SC,...); hoạt chất khác (Tiptop 250EC, Athuoctop 480SC, Nevo 330EC,...).

*** Lưu ý:**

+ Nếu các đối tượng dịch hại cần phòng trừ xuất hiện cùng 1 lúc có thể phối hợp các loại thuốc nhưng vẫn giữ nguyên nồng độ của mỗi loại.

+ Trong thời gian 4 giờ sau phun gặp mưa phải phun trừ lại.

- **Đối với bệnh bạc lá lúa:** Hiện nay chưa có thuốc đặc trị nên không để lúa dư thừa đạm, **đặc biệt là không bón phân ở giai đoạn lúa đòng - trổ** để hạn chế bệnh bạc lá phát sinh, gây hại.

2. Chỉ đạo các cơ quan chức năng, nhất là UBND cấp xã tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh thuốc BVTV và vật tư nông nghiệp trên địa bàn. Chỉ đạo, khuyến cáo các cửa hàng, đại lý kinh doanh thuốc BVTV chỉ cung ứng những loại thuốc có trong danh mục và theo hướng dẫn của Chi cục Trồng trọt & BVTV./.

Nơi nhận:

- Đ/c Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy; VP UBND tỉnh (Đề B/c)
- Cục TTr, Cục BVTV;
- Các đ/c lãnh đạo Sở;
- Trung tâm BVTV phía Bắc;
- Như trên;
- Một số đơn vị có liên quan;
- Website Sở; Chi cục TT&BVTV;
- Lưu: VT, TT&BVTV.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Sinh Tiến