

THÔNG BÁO

Tình hình sản xuất nông nghiệp và các biện pháp tập trung chỉ đạo trong thời gian tới

Thời gian qua Nhân dân và cán bộ Ban Nông nghiệp xã đã tập trung chỉ đạo, thực hiện các biện pháp chăm sóc bảo vệ lúa và cây màu vụ Xuân, đến nay dàn lúa đã bước vào giai đoạn chín đỏ đuôi và sẽ thu hoạch từ ngày 10- 15/6/2023; Lạc Xuân đã hình thành củ chắc, dự kiến sẽ thu hoạch từ ngày 05-10/6/2023;

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hoạch nhanh gọn lúa Xuân, tập trung cải tạo hệ thống thủy lợi vùng nuôi trồng thủy sản nước mặn lợ cánh đồng Duyên Hải, cánh đồng 1 Hưng Thịnh và bảo vệ cây màu vụ Hè, UBND xã yêu cầu Ban nông nghiệp xã, Hội đồng các xóm cần tập trung chỉ đạo và làm tốt một số nội dung cụ thể như sau:

1. Đối với diện tích trồng lúa

- Chỉ đạo đội thủy nông viên mở các cống đập đầu mối, các hộ trồng lúa mở toàn bộ cửa máng để tổ chức tiêu rút nước phơi ruộng từ ngày 25/5-16/6/2023, nhằm mục đích giúp lúa chín đồng đều và đất ruộng khô phục vụ đưa máy gặt đập liên hợp vào thu hoạch lúa Xuân nhanh gọn. Sau khi rút cạn sẽ tiến hành đóng toàn bộ phai đập cấp 2, cấp 3 để khoanh khoá phục vụ rút nước hiệu quả. Do đó, các hộ có diện tích nuôi trồng thủy sản nước ngọt xen lẫn trồng lúa cần chủ động các biện pháp cấp và thay nước phù hợp cho ao nuôi để đảm bảo mực nước trong ao nuôi. Nghiêm cấm xả nước làm ướt mặt ruộng.

- Ban nông nghiệp xã, Hội đồng 05 xóm vùng Thống Nhất huy động nhân lực, hợp đồng chặt chẽ với các tổ máy gặt đập liên hợp tập trung thu hoạch lúa Xuân cho nhân dân với phương châm “xanh nhà hơn già đồng” để tránh thiệt hại do thời tiết gây ra; xử lý nghiêm các trường hợp cản trở các phương tiện tham gia thu hoạch lúa Xuân. Lưu ý: đối với các máy gặt đập từ các huyện khác, tỉnh khác trước khi xuống gặt phải được vệ sinh và loại bỏ hạt lúa còn tồn dư trong máy để tránh lây lan lúa cỏ vào địa bàn xã; vệ sinh sạch sẽ không vương vãi bùn, đất khi di chuyển và đảm bảo an toàn giao thông.

- Tuyên truyền, vận động các hộ trồng lúa không phơi thóc, phơi rơm rạ trên các tuyến đường làm mất an toàn giao thông; không đốt, sả rơm rạ xuống kênh mương gây ô nhiễm môi trường và ách tắc dòng chảy.

2. Đối với diện tích nuôi trồng thủy sản nước mặn, lợ

- Từ ngày 24/05/2023 công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Hải Hậu đã tiến hành thông cửa cống Cồn Tròn Lớn và nạo vét tuyến kênh ven đê tuyến 2 cánh đồng Xuân Trung, Xuân Đài Đông, đảm bảo cho việc thay tháo nguồn nước đã bị tù đọng trong các hệ thống kênh mương lâu ngày. Chính vì vậy, yêu cầu cần chỉ đạo các hộ nuôi trồng thủy sản tập trung nạo vét, khơi thông các đầu kênh mương dẫn nước để tháo rửa toàn bộ hệ thống và dẫn nguồn nước mới sạch hơn cải tạo môi trường, phục vụ nuôi trồng thủy sản.

- Trong thời gian tới thời tiết sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp, có nhiều biến động, có thể có những đợt nắng nóng kéo dài kết hợp mưa lớn dẫn đến môi trường ao nuôi có những biến đổi bất lợi cho động vật thủy sản. Để quản lý tốt các yếu tố môi trường nước vùng nuôi, hạn chế những thiệt hại có thể xảy ra, các hộ nuôi cần thực hiện một số các biện pháp như sau:

+ Vùng nuôi tôm nước mặn, lợ: Khi cấp nước cho ao nuôi, cần lấy nước vào ao lắng qua túi lọc dày (đường kính lỗ lọc $\leq 200 \mu\text{m}$) lúc đỉnh triều con nước; sử dụng các hóa chất được phép lưu hành trên thị trường để khử trùng nước (Chlorine 10-20 ppm); chạy quạt khí để loại bỏ tồn dư hóa chất khử trùng, giảm N-NH₄ và N-NO₂ trong nước trước khi cấp vào ao nuôi.

+ Vùng nuôi nước ngọt: Hiện nay đang là thời điểm giao mùa, các yếu tố môi trường vùng nuôi như nhiệt độ, pH, DO... có thể biến động đột ngột, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của cá nuôi: cá nuôi dễ bị stress, yếu sẽ tạo điều kiện cho các tác nhân gây bệnh như ký sinh trùng, nấm, vi khuẩn, vi rút phát triển gây ra các bệnh như bệnh xuất huyết, bệnh đốm đỏ do vi khuẩn, nấm thủy mi và hội chứng bệnh lở loét trên cá... gây thiệt hại lớn cho người nuôi. Để giúp đối tượng nuôi sinh trưởng và phát triển tốt trong giai đoạn chuyển mùa, người nuôi cần chú ý: Theo dõi điều chỉnh lượng thức ăn cho cá vừa đủ theo từng giai đoạn phát triển của cá, không để dư thừa gây ô nhiễm môi trường ao nuôi. Khi thời tiết thay đổi đột ngột cần giảm lượng thức ăn của cá từ 30 – 50% so với lượng thức ăn cho cá ăn hàng ngày. Bổ sung vitamin B1, C vào thức ăn để tăng cường sức đề kháng cho cá nuôi.

3. Đối với diện tích trồng màu

- Hiện nay trên diện tích trồng dưa lê đang bị đối tượng bọ phấn trắng gây hại, nếu không phòng trừ kịp thời bọ phấn sẽ chích hút nhựa cây khiến cây sinh trưởng, phát triển kém, còi cọc, cho năng suất thấp. Nguyên nhân do diện tích cây trồng vụ trước sử dụng các loại thuốc trừ sâu phổ rộng phun nhiều lần. Đồng thời, ở những diện tích sau khi thu hoạch hành không được vệ sinh tốt, cộng thêm điều kiện thời tiết nắng nóng là những nguyên nhân giúp bọ phấn trắng phát sinh, phát triển mạnh.

Để phun trừ đối tượng bọ phấn trắng cần sử dụng đúng các loại thuốc đặc hiệu có hoạt chất Nitenpyram như: Elsin 600WP, AC Dinosin 500WP, Ramsuper 75WP,... Pha 1 gói/bình 16 lít nước . Lưu ý khi phun: nên hạ thấp vòi phun, phun chéo theo hướng 45⁰ để nước thuốc tiếp xúc với bọ phấn trắng đang trú ngụ ở mặt dưới của lá dưa.

- Tiếp tục tiến hành chăm sóc dưa khi thân chính được 5 lá thì tiến hành bấm ngọn để kích phát triển nhánh, khi cây ra nhánh giữ lại 2 nhánh cấp 1 phát triển, nhánh cấp 1 được 5- 6 lá thì bấm ngọn để cho 5 nhánh cấp 2 phát triển, khi nhánh thứ 2 được 5- 6 lá thì bấm ngọn để 5 nhánh cấp 3 phát triển. Giai đoạn cây ra hoa, đậu quả mỗi cây dưa chỉ nên để 8- 10 quả tùy theo lực của cây. Để tránh bị gió lật dây nên dùng gim tre để cố định dây dưa hoặc đất phủ lên vị trí đốt dây dưa cách khoảng 50- 60 cm.

Trên đây là một số nhiệm vụ trọng tâm đối với sản xuất nông nghiệp thời gian tới, yêu cầu Ban nông nghiệp xã, Hội đồng các xóm tập trung tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Phòng Nông nghiệp và PTNT;
 - BTV Đảng ủy;
 - TT HĐND xã;
 - Ban Nông nghiệp xã;
 - Hội đồng 12 xóm;
 - Đảng trang TTĐT xã;
 - Lưu: VP, ĐCXDNTM./.
- (Để báo cáo)

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Chinh