

Số: 09/TB-BNN

Nghĩa Sơn, ngày 27 tháng 9 năm 2024

THÔNG BÁO
Phun trừ sâu bệnh hại lúa cuối vụ Mùa 2024

Căn cứ Công văn số 1498/UBND-PNN ngày 27/9/2024 của UBND huyện Nghĩa Hưng về việc phun trừ sâu bệnh hại trên lúa vụ Mùa 2024.

Vụ Mùa 2024, do ảnh hưởng của các đợt mưa lũ kéo dài nên sản xuất lúa mùa bị ảnh hưởng lớn. Hiện nay, trên đồng ruộng, sinh trưởng của lúa mùa chia làm rất nhiều trà khác nhau, thời gian trổ bông kéo dài. Qua kết quả kiểm tra của Ban Nông nghiệp xã thấy xuất hiện các đối tượng sâu bệnh hại chính như sau:

- Sâu cuốn lá nhỏ lúa 7: Bướm vũ hóa rộ từ ngày 20-26/9 và có thể kéo dài đến cuối tháng, mật độ phổ biến 1-2 con/m², nơi cao 5-7 con/m², cá biệt >10 con/m². Sâu non nở rộ từ ngày 27/9-2/10, mật độ trung bình 40-60 con/m², nơi cao 100-150 con/m², cá biệt >250 con/m².

- Sâu đục 2 chấu: Sâu non có khả năng gây hại cho trà lúa mùa trổ bông sau ngày 25/9.

Để đảm bảo an toàn cho lúa mùa 2024, Ban Nông nghiệp xã đề nghị Hội đồng quản trị 2 Hợp tác xã, cán bộ chuyên môn Ban Nông nghiệp xã tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các hộ nông dân tự kiểm tra đồng ruộng, xác định những diện tích lúa có mật độ sâu, bệnh hại tới ngưỡng phun trừ kịp thời, đạt hiệu quả cao:

1. Phun trừ sâu cuốn lá nhỏ lúa 7

- Trà lúa mùa (đòng đã già) trổ bông xong trước ngày 05/10, phun trừ vào thời điểm lúa bắt đầu trổ từ 1-5% (lúa trổ đến đâu phun đến đấy) sử dụng thuốc trừ sâu đục thân để trừ được cả 2 đối tượng trừ sâu đục thân và sâu cuốn lá nhỏ.

- Trà lúa mùa trổ bông sau ngày 05/10 phun trừ sâu cuốn lá nhỏ cho những diện tích lúa có mật độ sâu non từ 20 con/m² trở lên.

- Thời gian phun trừ: **Từ ngày 30/9-02/10/2024.**

- Sử dụng một trong các loại thuốc để trừ sâu cuốn lá: Clever 150SC, lượng dùng 6ml, August 350 WG, lượng dùng 3gam... Mỗi loại thuốc trên pha đều với 20 lít nước phun cho một sào.

Sau phun 5 ngày nếu mật độ sâu sống ≥ 50 con/m² cần phải phun lại.

2. Phun trừ sâu đục thân

- Phun trừ sâu đục thân bướm 2 chấu cho trà lúa mùa trổ bông sau ngày 25/9 có mật độ ổ trứng $\geq 0,2$ ổ/m².

- Thời điểm phun trừ khi lúa bắt đầu trổ 1-5% số bông.

- Sử dụng một trong các loại thuốc đặc hiệu trừ sâu đục thân: Voliam Targo 063SC, lượng dùng 15ml; Virtako 40WP, lượng dùng 4,5 gam... Mỗi loại thuốc trên pha 20 lít nước phun cho 1 sào.

3. Phun phòng, trừ bệnh đạo ôn cổ bông, bệnh lem lép hạt

Phun phòng bệnh đạo ôn cổ bông cho các giống nhiễm như Nếp các loại,

BC15; Bệnh lem lép hạt (nếu thời gian lúa trổ gặp mưa)... khi lúa bắt đầu trổ 1-5% số bông.

***Lưu ý:**

- Nếu các đối tượng dịch hại xuất hiện cùng 1 lúc có thể phối hợp các loại thuốc nhưng vẫn giữ nguyên nồng độ của mỗi loại.

- Trong thời gian phun trừ thời tiết có thể có mưa vì vậy cần lách thời tiết, tranh thủ lúc tạnh ráo để phun trừ.

- Sau khi phun thuốc chưa được 4 giờ gặp mưa phải phun trừ lại, lượng thuốc và lượng nước phun như lần 1./.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy, HĐND, UBND xã; (để b/c)
- HĐQT 2 HTX NN; C/m BNN; (để t/c t/h)
- Đài truyền thanh xã;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
PHÓ CHỦ TỊCH KIỂM TRƯỞNG BAN NN**

Nguyễn Văn Thịnh