

THÔNG BÁO
Phun trừ sâu bệnh hại lúa vụ Xuân 2025

Qua kiểm tra của Ban Nông nghiệp xã đến ngày 28/4/2025, hiện nay trên đồng ruộng đang xuất hiện một số đối tượng sâu bệnh hại chính như sau:

- **Sâu cuốn lá nhỏ lúa 2:** Bướm vũ hóa rộ từ ngày 25/4- 01/5 và có thể kéo dài đến ngày 05/5, mật độ bướm phổ biến 0,2- 0,3 con/m², nơi cao 1-3 con/m², cục bộ >5 con/m². Sâu non nở rộ từ ngày 2-7/5, mật độ phổ biến từ 15-30 con/m², nơi cao 80-100 con/m², cá biệt >150 con/m².

Đây là lúa sâu ra rải, lúa kéo dài, phân bố không đồng đều. Sâu non nở sẽ gây hại trực tiếp đến bộ lá đồng làm ảnh hưởng lớn đến năng suất lúa, nếu không tổ chức phun trừ kịp thời.

- **Rầy lúa 2 (chủ yếu là rầy lưng trắng):** Rầy nở rộ từ ngày 28/4-6/5, mật độ phổ biến 300-500 con/m², nơi cao 1500-2000 con/m², cục bộ ỏ >3000 con/m². Rầy tiếp tục bổ sung mật độ trong thời gian tới.

- **Bệnh khô vằn:** Bệnh xuất hiện và phát triển mạnh trên các trà lúa. Bệnh tiếp tục lây lan nhanh và gây hại trên các trà lúa từ nay đến cuối vụ.

- **Bệnh đạo ôn lá:** Có khả năng gây hại cho các giống lúa nhiễm như Nếp các loại, BC15, dài thơm... tỷ lệ bệnh nơi cao 5-10%, cục bộ 20-30% đã xuất hiện ỏ lùn lụi.

Để hạn chế đến mức thấp nhất tác hại do sâu, bệnh gây ra, Ban Nông nghiệp xã đề nghị Hội đồng quản trị 2 HTX tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các hộ nông dân tự kiểm tra đồng ruộng xác định đúng mật độ sâu, bệnh hại tới ngưỡng để phun trừ kịp thời đạt hiệu quả cao:

1. Đối với sâu cuốn lá nhỏ lúa 2: Tập trung phun trừ sâu cuốn lá nhỏ lúa 2 cho những diện tích lúa Xuân có mật độ sâu từ 20 con/ m² trở lên.

Thời gian phun trừ từ ngày **03-07/5/2025**.

Thuốc dùng: Sử dụng một trong các loại thuốc sau: Clever 150 SC, lượng dùng 6ml, Voliam Targo 063SC, lượng dùng 10ml, Obaone 95WG, lượng dùng 10 gam ... Mỗi loại thuốc trên pha đều với 20 lít nước phun cho một sào.

Sau khi phun thuốc 5 ngày kiểm tra lại nếu mật độ sâu còn 50 con/m² cần phải phun trừ lại, lượng thuốc và lượng nước phun như lần 1.

2. Đối với rầy lúa 2 (chủ yếu là rầy lưng trắng): Kiểm tra và phun trừ rầy lúa 2 cho những diện tích lúa có mật độ rầy từ 30 con/khóm (1000 con/m²) trở lên, kết hợp phun trừ cùng sâu cuốn lá nhỏ.

Sử dụng một trong các loại thuốc sau: Chess 50 WG, lượng dùng 15g, AC Dinosin 50 WP lượng dùng 11g...Mỗi loại thuốc trên pha đều với 20 lít nước phun cho 1 sào.

3. Bệnh khô vằn: Phun trừ khô vằn cho những diện tích lúa chớm xuất hiện bệnh.

Sử dụng một trong các loại thuốc sau: Anvil 5SC, Chevin 5SC, lượng dùng 40 ml, Tiltsuper 300EC, lượng dùng 10 ml...Mỗi loại thuốc trên pha đều với 20 lít nước phun cho 1 sào.

4. Bệnh đạo ôn lá: Kiểm tra và tiếp tục phun phòng bệnh đạo ôn cổ bông cho các giống nhiễm như Nếp các loại, BC15, Đài thơm 8...đã phun trừ mà vết bệnh chưa dừng.

Phun phòng bệnh đạo ôn cổ bông khi lúa trổ 1-5% diện tích (ruộng trổ trước phun trước, ruộng trổ sau phun sau) cho các giống nhiễm như Nếp các loại, BC15, Đài thơm 8...đặc biệt là trà lúa trổ bông trước ngày 15/5/ 2025, những diện tích đã nhiễm đạo ôn lá và khi lúa trổ gặp mưa.

Sử dụng một trong các loại thuốc đặc trị bệnh: Beam 75WP lượng dùng 16g, Kabim 30WP lượng dùng 20g... Mỗi loại thuốc trên pha đều 20 lít nước phun cho 1 sào.

Chú ý: Nếu các đối tượng dịch hại xuất hiện cùng 1 lúc có thể phối hợp các loại thuốc nhưng vẫn giữ nguyên nồng độ của mỗi loại.

Sau khi phun thuốc chưa được 4 giờ gặp mưa phải phun trừ lại, lượng thuốc và lượng nước phun như lần 1.

Ban Nông nghiệp xã yêu cầu: Hội đồng Quản trị 2 HTX chỉ đạo cán bộ đội trưởng sản xuất nông nghiệp tập trung đôn đốc, hướng dẫn bà con xã viên thực hiện tốt những nội dung thông báo trên để giành vụ lúa Xuân thắng lợi./.

Nơi nhận:

- TT ĐU, HĐND, UBND xã; (Đề b/c)
- HĐQT 2 HTX NN; (Đề t/c t/h)
- Đài truyền thanh xã;
- Lưu: VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
PHÓ CHỦ TỊCH
KIÊM TRƯỞNG BAN NN**

Nguyễn Văn Thịnh