

THÔNG BÁO
Phun trừ sâu bệnh hại lúa vụ Xuân 2025

Qua kết quả kiểm tra đồng ruộng của Ban Nông nghiệp xã, đến ngày 15/5/2025 các hộ xã viên trên địa bàn xã đã phun trừ sâu bệnh hại trong khung thời điểm tốt nhất nên kết quả phun trừ đạt hiệu quả cao. Tuy nhiên, một số hộ dân tự phát phun trừ quá sớm so với lịch chỉ đạo của huyện, của xã nên mật độ sâu bệnh hại còn sót lại cao, sẽ gây hại trực tiếp đến bộ lá đồng làm ảnh hưởng lớn đến năng suất lúa có thể dẫn đến mất mùa, nếu không tổ chức phun trừ kịp thời. Cụ thể:

- **Sâu cuốn lá nhỏ lúa 2 cao điểm 2:** Bướm vũ hóa rộ từ ngày 08-12/5/ và có thể kéo dài đến ngày 15/5; mật độ bướm phổ biến từ 0,2-0,3 con/m², nơi cao 2-3 con/m², cục bộ 5-7 con/m². Dự kiến sâu non nở rộ từ ngày 15-19/5, mật độ phổ biến 20-30 con/m², nơi cao 80-120 con/m², cục bộ > 150 con/m².

- **Bệnh khô vằn:** Tỷ lệ bệnh phổ biến 1-5%, nơi cao 7-10%, cá biệt >15%. Bệnh tiếp tục lây lan nhanh và gây hại trên các trà lúa từ nay đến cuối vụ.

- **Bệnh đạo ôn cổ bông:** Có khả năng gây hại cho các giống lúa nhiễm như Nếp các loại, BC15, Đài thơm...khi lúa trổ gặp mưa hoặc đêm và sáng trời nhiều sương.

- **Bệnh đen lép hạt:** Nếu thời gian lúa trổ gặp mưa bệnh có khả năng gây hại cho trà lúa đang trổ bông.

Để hạn chế đến mức thấp nhất tác hại do sâu, bệnh gây ra, Ban Nông nghiệp xã đề nghị Hội đồng quản trị 2 HTX tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các hộ nông dân tập trung phun trừ sâu, bệnh hại cho lúa Xuân như sau:

1. Đối với sâu cuốn lá nhỏ lúa 2 cao điểm 2: Tập trung phun trừ sâu cuốn lá nhỏ lúa 2 cao điểm 2 cho diện tích lúa xuân **chưa trổ bông có mật độ sâu non từ 20 con/m² trở lên.**

Thời gian phun trừ từ ngày **16-19/5/2025.**

Thuốc dùng: Sử dụng một trong các loại thuốc sau: Clever 150 SC, lượng dùng 6ml, Voliam Targo 063SC, lượng dùng 10ml...Mỗi loại thuốc trên pha đều với 20 lít nước phun cho một sào.

Sau khi phun thuốc 5 ngày kiểm tra lại nếu mật độ sâu còn 50 con/m² cần phải phun trừ lại, lượng thuốc và lượng nước phun như lần 1.

2. Bệnh khô vằn: Tiếp tục phun trừ bệnh cho những diện tích lúa đã phun trừ mà vết bệnh chưa dừng.

Sử dụng một trong các loại thuốc sau: Anvil 5SC, Chevin 5SC, lượng dùng 40 ml, Tilt super 300EC, lượng dùng 10 ml... Mỗi loại thuốc trên pha đều với 20 lít nước phun cho 1 sào.

3. Bệnh đạo ôn cổ bông: Phun phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông cho các giống nhiễm như Nếp các loại, BC15, Đài thơm 8... khi lúa bắt đầu trổ từ 1-5% số bông (lúa trổ trước phun trước, lúa trổ sau phun sau). Những diện tích lúa bị bệnh đạo ôn lá nặng thì cần phun trừ kép, lần 2 cách lần 1 từ 5-7 ngày.

Sử dụng một trong các loại thuốc đặc trị bệnh: Beam 75WP lượng dùng 16g, Kabim 30WP lượng dùng 20g... Mỗi loại thuốc trên pha đều 20 lít nước phun cho 1 sào.

4. Bệnh đen lép hạt: Phun phòng bệnh đen lép hạt cho trà lúa nếu thời gian lúa trổ gặp mưa.

Sử dụng một trong các loại thuốc đặc trị bệnh: Tilt super 300 EC lượng dùng 10 ml, Amistar top 325 SC lượng dùng 15ml... Mỗi loại thuốc trên pha đều 20 lít nước phun cho 1 sào.

Đối với lúa cỏ (lúa ma): Phát động nông dân cắt bỏ những bông lúa cỏ giai đoạn trổ bông – ngâm sữa đem tiêu hủy, tuyệt đối không vứt bỏ lúa cỏ trên ruộng, bờ ruộng, kênh mương để tránh hạt lúa cỏ rụng xuống đất, lây nhiễm cho vụ sau.

Chú ý: Nếu các đối tượng dịch hại xuất hiện cùng 1 lúc có thể phối hợp các loại thuốc nhưng vẫn giữ nguyên nồng độ của mỗi loại.

Sau khi phun thuốc chưa được 4 giờ gặp mưa phải phun trừ lại, lượng thuốc và lượng nước phun như lần 1.

Ban Nông nghiệp xã yêu cầu: Hội đồng Quản trị 2 HTX chỉ đạo cán bộ đội trưởng sản xuất nông nghiệp tập trung đôn đốc, hướng dẫn bà con xã viên thực hiện tốt những nội dung thông báo trên để giành vụ lúa Xuân thắng lợi./.

Nơi nhận:

- TT ĐU, HĐND, UBND xã; (Đề b/c)
- HĐQT 2 HTX NN; (Đề t/c t/h)
- Đài truyền thanh xã;
- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
PHÓ CHỦ TỊCH KIỂM TRƯỞNG BAN NN

Nguyễn Văn Thịnh