

THÔNG BÁO
Phòng trừ sâu bệnh hại cây lúa đầu tháng 8, vụ Mùa 2026

Qua kết quả điều tra đồng ruộng của Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công, Phòng Kinh tế xã đến nay các trà lúa phát triển tốt, độ đồng đều cao, lúa đang trong giai đoạn phân hóa - phát triển đồng. Hiện nay các đối tượng sâu bệnh gây hại xuất hiện như: sâu cuốn lá nhỏ lúa 5 đã vũ hóa và đẻ trứng, dự kiến sâu non nở rộ từ ngày 08 - 12/8 gây hại trên các diện tích lúa mùa sớm và các diện tích xanh tốt, ven lũy, ven thổ, mật độ nơi cao 50-70 con/m², cục bộ > 100 con/m²; sâu đục thân 2 chấm gây hại đánh héo rải rác. Ngoài ra, bệnh khô vằn và bệnh đốm sọc vi khuẩn xuất hiện gây hại cục bộ.

Để chủ động phòng trừ các đối tượng sâu bệnh hại trên trà lúa mùa, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã đề nghị Trưởng các thôn, các HTX SXKD DVNN và các hộ trồng lúa chủ động kiểm tra đồng ruộng và tổ chức phun phòng trừ một số đối tượng cụ thể như sau:

1. Sâu cuốn lá nhỏ lúa 5

- Sâu cuốn lá nhỏ lúa 5 đã vũ hóa và đẻ trứng, dự kiến sâu non nở rộ từ ngày 08-12/8 gây hại trên các diện tích lúa Mùa sớm và các diện tích xanh tốt, ven lũy, ven thổ, mật độ nơi cao 50-70 con/m², cục bộ > 100 con/m².

- Tổ chức phun trừ sâu cuốn lá nhỏ lúa 5 tập trung từ ngày 09 - 12/8 cho những diện tích có mật độ sâu từ 20 con/m² trở lên khi sâu non chủ yếu tuổi 1-2.

- Sử dụng một trong các loại thuốc sau: Clever 150SC, 300WG; August 350WG; Ammate® 150EC; Obaone 95WG; Solo 350SC; Dylan 10WG; Divine 180SC; Mepyda 240SC; Incipio® 200SC... liều lượng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

2. Bệnh khô vằn

- Bệnh đã phát sinh và gây hại rải rác, phun phòng trừ cho những diện tích có bệnh chớm xuất hiện (có thể kết hợp với sâu cuốn lá nhỏ lúa 5 và các dịch hại khác để phòng trừ); những diện tích lúa có tỷ lệ bệnh khô vằn $\geq 10\%$ số đánh phải phun trừ ngay.

- Sử dụng một trong các loại thuốc sau: Anvil® 5SC; Moren 25WG; Lervil 100SC; Chevin 5SC; Callihex 5SC; Nevo® 330 EC; Atulvil 5SC... liều lượng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

3. Bệnh đốm sọc vi khuẩn

- Phát sinh gây hại cục bộ đặc biệt trên trà lúa Mùa sớm bón phân không cân đối, xanh tốt. Đối với bệnh chỉ đạo phun trừ cho các diện tích có tỷ lệ bệnh $\geq 20\%$ lá.

- Sử dụng một trong các loại thuốc sau: Xantocin 40WP; Supervery 50WP; MAP Oni 2SL; Lk-one 50SC; Visen 20SC; Xanthomix 20WP; Lobo 8WP; Starwiner 20WP; Totan 200WP... liều lượng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

4. Chuột hại

Chuột gây hại chủ yếu tại các diện tích xanh tốt, ven lũy, ven thỏ. Tiếp tục tuyên truyền, phát động các hộ trồng lúa tích cực diệt chuột bằng nhiều biện pháp: Thực hiện diệt chuột bằng các biện pháp thủ công (cạm bẫy, đào bắt, quây rào nylon) hoặc sử dụng các loại thuốc diệt chuột sinh học có trong danh mục cho phép, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người, gia súc và môi trường.

Tuyệt đối không sử dụng điện để đánh bắt chuột.

*** Lưu ý:**

- Nếu các đối tượng dịch hại cần phòng trừ xuất hiện cùng 1 lúc thì có thể phối hợp các loại thuốc để phun nhưng vẫn giữ nguyên nồng độ của mỗi loại.

- Trong thời gian 4 tiếng sau phun nếu gặp mưa, cần phun lại.

5. Đề nghị các HTX SXKD DVNN, Trưởng các thôn, các cơ sở kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật hướng dẫn các hộ trồng lúa sử dụng các loại thuốc có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và phun phòng trừ theo phương châm 4 đúng (đúng thuốc, đúng nồng độ/liều lượng, đúng lúc và đúng cách).

- Đề nghị các hộ trồng lúa sau khi phun thuốc phòng trừ sâu bệnh, thu gom vỏ bao bì để vào các bể chứa nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường; đề nghị các cơ sở thôn đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác thu gom vỏ bao bì thuốc thực vật bỏ vào đúng nơi quy định.

Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã đề nghị các Hợp tác xã SXKD DVNN, Trưởng các thôn tăng cường kiểm tra đồng ruộng, tuyên truyền, hướng dẫn các hộ trồng lúa thực hiện tốt các nội dung thông báo này./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo UBND xã;
- Phòng Kinh tế;
- Các HTX SXKD DVNN;
- Trưởng các thôn;
- Các hộ kinh doanh vật tư nông nghiệp;
- Trang thông tin điện tử xã;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Đăng