

## THÔNG BÁO

### Tập trung phòng trừ rầy lúa 3 và sâu đục thân 2 chấm cuối vụ lúa vụ Xuân 2026

Kính gửi:

- Trưởng các cơ sở xóm;
- Các HTX dịch vụ nông nghiệp;
- Nhân dân trong toàn xã.

Hiện nay, đàn lúa Xuân toàn xã đã chổ cơ bản, đang phơi màu chín chắc xanh và mảy, còn một số diện tích lúa trở muộn. Qua kiểm tra: Rầy nâu, rầy lưng trắng lúa 3 bắt đầu nở, mật độ phổ biến từ 100 đến 200 con trên m<sup>2</sup>; có nơi từ 300 đến 500 con trên m<sup>2</sup>, dự báo sẽ gia tăng trong thời gian tới.

Dự kiến rầy lúa 3 tiếp tục nở rộ trên các diện tích lúa đã trở từ ngày 08 - 18/5; trên các diện tích lúa trở muộn sau ngày 10/5 rầy nở rộ từ ngày 23 - 30/5 và có hiện tượng gôi lúa tăng dần mật độ đến cuối vụ nếu không phát hiện và phun trừ kịp thời sẽ gây cháy diện hẹp đặc biệt các ruộng gieo cấy dày xanh tốt, ruộng trũng thường bị gây hại nặng ảnh hưởng lớn đến năng suất.

Bệnh sâu đục thân 2 chấm tiếp tục phát sinh gây hại trên các diện tích lúa chưa trở.

Để đảm bảo an toàn cho đàn lúa vụ Xuân năm 2026, UBND xã đề nghị Trưởng các cơ sở xóm, Các HTX DVNN; các hộ trồng lúa thực hiện tốt những nội dung sau:

#### **1. Đối với rầy nâu- rầy lưng trắng lúa 3**

Từ ngày 12/5/2026 UBND xã đề nghị các hộ gia đình trồng lúa tăng cường công tác kiểm tra đồng ruộng. Nếu phát hiện mật độ rầy nâu  $\geq 1.000$  con/m<sup>2</sup> kịp thời phun trừ rầy theo hướng dẫn sau:

- Sử dụng một trong các loại thuốc như: Nibas 50EC, Bassa 50EC, Vibasa 50EC... liều lượng theo hướng dẫn của nhà sản xuất (*Chú ý khi phun nhất thiết phải rẽ hàng 0,8 - 1 m để thuốc phun tiếp xúc trực tiếp với rầy*).

- Có thể sử dụng các loại thuốc Titan 600WG; TT Led 70WG; Dyman 500WP; Florid 700WP; Ramsuper 75WP; Palano 600WP; Vuachest 800WG pha thuốc theo đúng nồng độ trên nhãn mác, phun đảm bảo 32 lít nước thuốc/sào thì khi phun không cần phải rẽ lúa.

\* **Lưu ý:** Sau phun thuốc 3 ngày tiến hành kiểm tra, nếu mật độ rầy còn trên ngưỡng phòng trừ phải phun lại. Các diện tích lúa đã chín khoảng 80% nên gặt chạy rầy (*trước chín hoàn toàn 7 ngày*).

## **2. Đối với sâu đục thân 2 chấm**

Có hiện tượng đùn mật độ gây hại các diện tích lúa chưa trổ. Chỉ phun trừ cho các diện tích có mật độ ổ trứng  $\geq 0,3$  ổ/m<sup>2</sup> vào giai đoạn ngay khi lúa bắt đầu trổ. Sử dụng một trong các loại thuốc sau: Voliam targo 063SC; Prevathon® 200SC; Incipio® 200SC; Chlorferan 240SC-VUA ĐỤC THÂN ... liều lượng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

UBND xã Yêu cầu các HTX dịch vụ nông nghiệp, Trưởng các xóm và nhân dân trong toàn xã thực hiện tốt nội dung Thông báo trên. Trong quá trình thực hiện mọi vướng mắc phản ánh về UBND xã qua phòng Kinh tế để được giải đáp./.

### **Nơi nhận:**

- Thường trực UBND xã (*để báo cáo*);
- Như: Kính gửi
- Hệ thống truyền thanh xã;
- Trang TTĐT của xã;
- Lưu: VT, PKT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Phạm Hùng Kiên**