

Số: 66/KH-TTBVTV

Nam Định, ngày 15 tháng 6 năm 2017



## KẾ HOẠCH

### Diệt chuột bảo vệ sản xuất vụ Mùa 2017

Chuột là đối tượng dịch hại nguy hiểm, có khả năng gây hại lớn cho sản xuất nông nghiệp. Vụ Xuân 2017 được sự phối hợp chỉ đạo thống nhất, quyết liệt giữa các ban ngành, đoàn thể, các cấp từ tỉnh đến huyện, xã chỉ đạo diệt chuột tập trung, đồng loạt trong toàn tỉnh nên đã giảm thiệt hại do chuột gây ra. Diện tích cây trồng bị chuột gây hại vụ Xuân 2017 là 261,5 ha, trong đó diện tích nhiễm nặng là 2,5 ha, tương đương vụ Xuân 2016. Tuy nhiên do vụ Xuân và vụ Mùa rất gần nhau tạo điều kiện thuận lợi về nguồn thức ăn để chuột di trú và nhân nhanh số lượng nên vụ Mùa 2017 vẫn tiềm ẩn nguy cơ gây hại cao của chuột.

Để chủ động hạn chế tác hại của chuột, Chi cục Trồng trọt & Bảo vệ thực vật xây dựng kế hoạch diệt chuột bảo vệ sản xuất vụ Mùa 2017 như sau:

#### I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

##### 1. Mục đích

Hạn chế số lượng, giảm thiểu sự gây hại của chuột đối với sản xuất nông nghiệp; góp phần bảo vệ an toàn mùa màng, kho tàng và phòng ngừa nguy cơ chuột làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho cộng đồng.

##### 2. Yêu cầu

- Thực hiện diệt chuột thường xuyên nhưng cần xác định các đợt cao điểm để phát động chiến dịch diệt chuột đồng loạt nhằm đạt hiệu quả cao.

- Diệt chuột bằng nhiều hình thức; kết hợp nhiều biện pháp (hoá học, sinh học, thủ công), trong đó biện pháp sinh học và thủ công là chủ yếu. Tuyệt đối không dùng thuốc cấm, dùng điện và các biện pháp dễ gây nguy hiểm cho người, vật nuôi để diệt chuột.

- Thực hiện diệt chuột đúng kỹ thuật, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người, gia súc, gia cầm; chú trọng bảo vệ hệ thống kênh mương, đường giao thông nội đồng và giữ vệ sinh môi trường.

#### II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Xây dựng nội dung và tổ chức các hình thức tuyên truyền, phát động nhân dân trong toàn Tỉnh hưởng ứng chiến dịch ra quân diệt chuột đồng loạt với phương châm: "Nhà nhà diệt chuột, Người người diệt chuột".

- Nội dung tuyên truyền: Tác hại và nguy cơ gây hại của chuột đối với sản xuất, kho tàng và sức khỏe cộng đồng;

- Hình thức tuyên truyền: Thông qua các phương tiện truyền thông (Đài PTTH, Báo Nam Định và hệ thống truyền thanh ở các xã, phường, thị trấn và các cơ sở); các buổi hội thảo, nói chuyện chuyên đề về chuột.

- Thời gian tuyên truyền: thường xuyên trong suốt vụ.



2. Tổ chức các đợt ra quân diệt chuột đồng loạt:  
- Đợt I: Tập trung từ khi lấy nước làm đất đến khi cấy lúa (hoàn thành trước ngày 20/7).

- Đợt II: Tùy theo mức độ xuất hiện, gây hại của chuột để tiếp tục phát động tập trung từ khi cấy đến khi lúa đứng cái.

Áp dụng tổng hợp các biện pháp diệt chuột, trong đó coi trọng biện pháp sinh học và thủ công:

- Biện pháp sinh học: Bảo vệ và phát triển đàn mèo; sử dụng bả diệt chuột sinh học Biorat.

- Biện pháp thủ công: Sử dụng các loại bẫy kẹp vạn năng, bẫy sập, bẫy hom, bẫy dính hoặc soi đèn, đào bắt, hun khói...

- Biện pháp hóa học: Dùng các loại thuốc trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng và ít độc hại với môi trường như: nhóm Bromadiolone (Antimice 0.006GB, Cat 0.25WP, Broma 0.005AB, Killrat 0.005 Wax block ...); nhóm Brodifacoum (Forwarat 0.005%, Klerat 0.005%,...); nhóm Coumatetralyl (Racumin 0.75TP,...); nhóm Flocoumafen (Storm 0.005% Block bait,...);...

### III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Để việc diệt chuột hiệu quả, Chi cục Trồng trọt & Bảo vệ thực vật đề nghị:

1. Phòng Nông nghiệp & PTNT, Trạm Trồng trọt & Bảo vệ thực vật các huyện, thành phố:

- Phối hợp với các tổ chức đoàn thể, Đài PTTH địa phương tuyên truyền phát động toàn dân ra quân diệt chuột sớm ngay từ đầu vụ sản xuất, diệt chuột đồng loạt, thường xuyên, liên tục và mang tính cộng đồng.

- Tập huấn, giới thiệu các mô hình, kinh nghiệm hay; nhân rộng nhanh các biện pháp diệt chuột hiệu quả, an toàn.

- Tăng cường kiểm soát việc kinh doanh thuốc BVTV ở địa phương. Nghiêm cấm việc sử dụng thuốc ngoài danh mục, thuốc cấm, dùng điện và các biện pháp gây nguy hiểm cho người và vật nuôi.

2. UBND các xã, thị trấn thành lập các tổ, đội diệt chuột hoạt động liên tục trong suốt vụ sản xuất; có chính sách phù hợp, quy định rõ trách nhiệm của các tổ, đội diệt chuột và chế độ đóng góp của các hộ dân./.

#### Nơi nhận:

- Cục TT, Cục BVTV, TT BVTV phía Bắc;
- VP3 UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Sở NN&PTNT;
- Phòng Kế hoạch-Kỹ thuật Sở;
- Trung tâm Khuyến nông;
- UBND, Phòng NN-PTNT các huyện, TP;
- Trạm KN, TTr&BVTV các huyện, TP;
- Đài PT-TH, Báo Nam Định;
- BBT Website Sở NN&PTNT;
- Lưu HC-TH. VT.

#### CHI CỤC TRƯỞNG



Trần Ngọc Chính



**Phụ lục: Hướng dẫn các biện pháp diệt chuột**

<b>Địa điểm</b>	<b>Biện pháp cụ thể</b>
<p><b>Ngoài đồng:</b> Tập trung diệt chuột ở gò, cồn, bờ cao, bãi hoang và vùng trồng cây vụ Đông là nơi có nhiều chuột cư trú.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thu gom sạch tàn dư cây trồng, đào hang nơi chuột cư trú, phát quang bụi rậm.</li> <li>- Kết hợp các đợt lấy nước phục vụ làm đất, dồn chuột lên gò, bờ cao để tập trung tiêu diệt bằng biện pháp sau:             <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Dùng thuốc sinh học Biorat, lượng 2,5-3 kg/ha đặt ở cửa hang và lối đi lại, bờ đê, nương, gò, cồn, vườn cây... mỗi mô 5-10 gam.</li> <li>+ Thuốc nhóm Coumatetralyl (Racumin 0.75TP,...) dùng 20 gam trộn với 380 gam thóc chia thành 7-10 mồi.</li> <li>+ Thuốc nhóm Bromadiolone (Cat 0.25 WP, Killrat 0.005Wax block...) dùng một gói 10 gam thuốc trộn đều với 500gam (mộng mại, gạo, cơm nguội, cua nhỏ, tép, cá con), chia bả thành 10 mồi. Thuốc Antimice 0.006GB bả trộn sẵn đặt 5-10 gam/điểm.</li> <li>+ Nhóm Brodifacoum: Forwarat 0.005% sử dụng 10kg/ha, Klerat 0.005% 1-3 kg/ha.</li> </ul> </li> <li>- Đặt bả: cứ 5-10m đặt 1 bả, đặt bả vào buổi chiều, tối gần nơi chuột phá hại và đặt trên đường chuột đi, tránh ngập nước.</li> </ul>
<p><b>Vùng gieo mạ</b> (trong làng và ngoài đồng). Mạ là thức ăn ưa thích của chuột.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tùy theo hoạt động của chuột có thể rào chắn bằng nylon, kết hợp với đặt các loại bẫy như: Bẫy kẹp vạn năng, bẫy sập, bẫy hom, bẫy dính...</li> <li>- Thuốc sử dụng: thuốc sinh học Biorat, Antimice 0.006GB, Cat 0.25WP, Killrat 0.005Wax block, Forwarat 0.005%, Racumin 0.75TP, Storm 0.005% block bait,...</li> <li>- Những nơi nylon bị rách, thường là nơi chuột ra đi lại có thể đặt bẫy hom.</li> </ul>
<p><b>Vùng ven làng</b> (là nơi chuột thường xuyên di chuyển từ ngoài đồng vào làng và ngược lại sau mỗi vụ sản xuất. Do vậy diệt chuột ở vùng này có ý nghĩa rất lớn).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Săn bắt: Tìm kiếm các hang, ổ của chuột để đào, đổ nước, hun khói hoặc dùng chó để săn bắt chuột.</li> <li>- Quan sát đường đi của chuột, sử dụng các loại bẫy thủ công đặt trên đường di chuyển của chuột.</li> <li>- Soi đèn kết hợp với dùng vợt, gậy, đâm để diệt chuột.</li> <li>- Sử dụng các loại thuốc sinh học Biorat, Cat 0.25WP, Antimice 0.006GB, Killrat 0.005Wax block, Forwarat 0.005%, Klerat 0.005%, Racumin 0.75TP, Storm 0.005% block bait,...</li> </ul>
<p><b>Trong khu dân cư</b> (là nơi sinh sống và cư trú thường xuyên của chuột).</p>	<p>Thường xuyên chú ý bảo vệ và phát triển đàn mèo. Nên dùng các loại bẫy và biện pháp thủ công để diệt chuột là chính.</p>