

THÔNG BÁO

Tình hình sâu bệnh cuối tháng 8 – đầu tháng 9

Biện pháp phòng trừ

I. Cây trồng

- Diện tích lúa mùa trung: đang làm đòng – Dự kiến trổ bông từ ngày 10 – 20/9;
- Diện tích lúa mùa muộn: Để nhánh rộ.

II. Tình hình sâu bệnh – Dự báo

1. Sâu cuốn lá nhỏ

Sâu cuốn lá nhỏ lúa 5 cao hơn cùng kỳ năm trước mật độ sâu non phổ biến 10 - 15 con/m², cao 20 - 30 con/m², cục bộ 50 - 70 con/m².

Hiện tại, trường thành sâu cuốn lá nhỏ lúa 6 đang vũ hóa và vũ hóa rộ đến ngày 26/8. Dự báo: Sâu non lúa 6 nở rộ từ ngày 27/8 - 02/9, mật độ sâu phổ biến 50 - 90 con/m², cao 200 - 300 con/m², cục bộ >500 con/m².

2. Rầy nâu – RLT

Rầy lưng trắng lúa 4 có mật độ trung bình 300 - 450 con/m², nơi cao 600 - 900 con/m², cá biệt 1.200 - 1.500 con/m². Mật độ rầy cao hơn cùng kỳ năm trước do điều kiện thời tiết thuận lợi cho rầy phát sinh và gây hại. Toàn huyện đã tổ chức phun thuốc trừ rầy lúa 4 tập trung từ ngày 28/7 - 02/8, tuy nhiên trong thời gian phun trừ bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 2 mưa nhiều nên diện tích phun trừ chưa được cao. Hiện tại, rầy phổ biến tuổi 5, trường thành, trứng.

Dự báo: Rầy lúa 5 (chủ yếu rầy lưng trắng) sẽ nở rộ từ ngày 25/8 – 3/9; mật độ phổ biến 300 - 500 con/m², cao 1.000 - 1.500 con/m², cục bộ >2.000 con/m².

3. Sâu đục thân bướm hai chấm

Nguồn sâu đục thân bướm hai chấm cao tương đương với cùng kỳ năm 2019, đã xuất hiện trên tất cả các trà ở các địa phương trong huyện (Xuân Đài, Xuân Ngọc ...). Dự báo sâu đục thân lúa 4 sẽ phát sinh và gây hại trên trà lúa trổ sớm đầu tháng 9.

4. Bệnh khô vằn

Bệnh đã bắt đầu xuất hiện rải rác trên trà lúa mùa trung tốt sớm, gieo cấy dày với tỷ lệ bệnh cao 5 - 7%. Thời gian tới bệnh sẽ tiếp tục phát sinh, lây lan mạnh trên các trà lúa từ nay đến cuối vụ.

5. Bệnh lùn sọc đen Phương Nam

Từ đầu vụ đến nay bệnh phát sinh rải rác ở một số địa phương trong huyện (Thọ Nghiệp, Xuân Phương, Xuân Vinh ...), mức độ xuất hiện - phát sinh của bệnh cao hơn so với cùng kỳ năm 2019.

III. Biện pháp phòng – trừ

1. Đối với sâu cuốn lá nhỏ lúa 6

Tổ chức phun trừ sâu CLN lúa 6 từ ngày 27/8 – 02/9 cho những diện tích có mật độ sâu ≥ 20 con/m².

Sử dụng thuốc: có hoạt chất Indoxacarb (*Clever 150SC; 300WG, Obaone 95WG, Divine 180SC, Blugent 75SC 20ml, ...*); hoạt chất Emamectin (*Angun 5WG, Dylan 5WG, Techtimex 50WG, ...*); hoạt chất khác (*Match 050EC, Hagold 75WG, Takumi 20WG, 20SC; Voliam Targo 063SC, ...*). Sau phun 05 ngày nếu mật độ sâu sống còn ≥ 50 con/m² cần phải phun trừ lại.

2. Đối với rầy nâu – rầy lưng trắng lúa 5

Phun kết hợp cùng với CLN lúa 6 cho những diện tích có mật độ rầy ≥ 30 con/khóm (*1.000 con/m²*).

Sử dụng thuốc: hoạt chất Pymetrozine (*Chatot 600WG, Chess 50WG, Chersieu 75WG, ...*); hoạt chất Thiamethoxam (*Actara 25WG, Amira 25WP, Impalaser 25WG, ...*); hoạt chất Buprofezin + Imidacloprid (*Cytoc 250WP, Gold Tress 10WP, Babsax 300WP, ...*). Sau phun 3 ngày kiểm tra ruộng, nếu mật độ rầy còn ≥ 30 con/khóm (*1.000 con/m²*) phải phun lại.

3. Đối với bệnh khô vằn

Phát hiện và phun trừ cho những diện tích bệnh chớm xuất hiện.

Sử dụng thuốc: có hoạt chất Pencycuron (*Moren 25WP, ...*), hoạt chất Hexaconazole (*Anvil 5SC, Chevin 5S, ...*), hoạt chất khác (*Amistar top 325SC, Validacin 5L, ...*).

4. Đối với bệnh đạo ôn cổ bông

Phun phòng bệnh lúc lúa trổ 3 - 5% số bông (*ruộng trổ trước phun trước, ruộng trổ sau phun sau*) cho các giống nhiễm như: Dự Hương, BC 15, TBR 225, Q5, QR1, Nếp, Thiên ưu 8, Đài thơm 8,

Sử dụng thuốc có hoạt chất Tricyclazole (*Kabim 30WP, Kasai-S 92SC, Filia 525SE, Bamy 75WP, ...*); hoạt chất khác (*Bump 650 WP, Bumrosai 650WP, Bankan 600WP, ...*). Không nên sử dụng các loại thuốc chỉ chứa 1 hoạt chất Isoprothiolane để phun phòng bệnh đạo ôn cổ bông.

5. Đối với sâu đục thân bướm 2 chấm

Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện tiếp tục điều tra, theo dõi và sẽ có thông báo cụ thể thời gian và biện pháp phòng trừ sau.

6. Đối với bệnh bạc lá – đốm sọc vi khuẩn

Sau đợt mưa to kèm giông gió bệnh có thể phát sinh trên những diện tích bón thừa đạm. Hiện nay, bệnh chưa có thuốc đặc trị, vì vậy không nên phun thuốc để trừ bệnh này. Nếu phát hiện bệnh cần giữ đủ nước trong ruộng, ngừng bón phân hay phun thuốc kích thích sinh trưởng.

* **Lưu ý:** - Nếu các đối tượng dịch hại cần phòng trừ xuất hiện cùng 1 lúc có thể phối hợp các loại thuốc nhưng vẫn giữ nguyên nồng độ của mỗi loại.

- Trong thời gian 4 giờ sau phun gặp mưa phải phun trừ lại.

Đối với bệnh lùn sọc đen Phương Nam: thường xuyên theo dõi, kiểm tra đồng ruộng nếu phát hiện khóm lúa có triệu chứng của bệnh (cây thấp lùn, lá xanh đậm, lá xoắn vặn hoặc rách ...) nhỏ, vùi nguồn bệnh ngay lập tức để hạn chế sự lây lan, phát tán của bệnh.

Đối với chuột: tích cực tiêu diệt bằng các biện pháp thủ công như đào bắt kết hợp với các loại bẫy. Tuyệt đối không dùng điện và các biện pháp dễ gây nguy hiểm cho người, vật nuôi để diệt chuột./.

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy; UBND huyện;
 - Chi cục TT & BVTV tỉnh Nam Định;
 - Phòng NN & PTNT;
 - Đài phát thanh huyện;
 - Đội QLTT số 5;
 - Ban Nông nghiệp các xã, Thị trấn;
 - Các HTX SXKDDVNN;
 - Các tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc BVTV trong toàn huyện;
 - Cổng thông tin điện tử huyện;
 - Lưu VT.
- } (để BC)



Nguyễn Xuân Trường