

Số: 351/SNN-TTBVTV  
V/v Tập trung phòng trừ Rầy  
cuối vụ Xuân 2018

Nam Định, ngày 25 tháng 5 năm 2018

Kính gửi: - UBND, Phòng Nông nghiệp & PTNT các huyện, thành phố;  
- Trạm: Trồng trọt & BVTV, Khuyến nông các huyện, thành phố.

Theo báo cáo của Chi cục Trồng trọt và BVTV: Rầy lúa 3 (chủ yếu rầy nâu) đang nở rộ, mật độ cao hơn TBNN; phổ biến 500 - 700 con/m<sup>2</sup>, nơi cao 1.000-2.000 con/m<sup>2</sup>, cá biệt có nơi trên 5.000 con/m<sup>2</sup>. Những nơi có mật độ cao là: Giao Yến, Giao Hà, Giao Châu, Giao Long (Giao Thủy); Hải Ninh, Hải Hưng, Hải Hòa (Hải Hậu); Nghĩa Hải, Nghĩa Bình, Nghĩa Tân (Nghĩa Hưng); Nam Thái, Đồng Sơn, Hồng Quang (Nam Trực); Hiền Khánh, Minh Thuận, Hợp Hưng (Vụ Bản); Xuân Tiến (Xuân Trường)...

Trong thời gian tới thời tiết nắng nóng kết hợp có mưa sẽ rất thuận lợi cho rầy phát sinh và gia tăng mật độ. Dự kiến diện tích cần trừ rầy toàn tỉnh khoảng 15.000 ha (20% diện tích). Một số nơi có thể bị cháy rầy nếu không phát hiện và phun trừ kịp thời.

Trước tình hình trên, Sở Nông nghiệp & PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Nông nghiệp & PTNT, Trạm Trồng trọt & BVTV, Trạm Khuyến nông và Ban Nông nghiệp xã thực hiện tốt một số việc sau:

1. Tổ chức kiểm tra đồng ruộng để xác định và khoanh vùng những nơi, những diện tích nhiễm rầy mật độ cao cần phun thuốc trừ rầy. Tập trung kiểm tra ở những vùng thường xuyên bị nhiễm rầy ở các vụ trước.

2. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các hộ nông dân tự kiểm tra đồng ruộng để phát hiện những diện tích hoặc các ổ rầy mật độ cao và hướng dẫn sử dụng thuốc, biện pháp kỹ thuật trừ rầy hiệu quả, an toàn môi trường.

3. Tập trung phun trừ rầy từ 28/5-05/6 cho những diện tích có mật độ  $\geq 50$  con/khóm ( $\geq 1500$  con/m<sup>2</sup>) khi rầy ở tuổi 1-3. Sử dụng các loại thuốc nội hấp - không phải rẽ hàng như:

- Thuốc có hoạt chất Nitenpyram (*Dyman 500WP; Florid 700WP; Ramsuper 75WP; Startcheck 755WP...*);

- Thuốc có hoạt chất Pymetrozine (*Silwet 300WP; Topchest 550WG...*);

\* **Chú ý:** Phun đúng, đủ liều lượng thuốc, đảm bảo 30-48 lít nước thuốc/sào. Sau phun thuốc 3 ngày cần kiểm tra lại, nếu mật độ rầy còn  $\geq 50$  con/khóm ( $\geq 1500$  con/m<sup>2</sup>) phải phun lại. Đây là lúa rầy nở kéo dài nên sau phun thuốc cần thường xuyên kiểm tra để có biện pháp xử lý kịp thời. Trường hợp lúa chín  $\geq 80\%$  mà có mật độ rầy cao, nên gặt "chạy rầy".

4. Tăng cường kiểm tra các hoạt động kinh doanh thuốc BVTV trên địa bàn. Chỉ đạo, khuyến cáo các cửa hàng, đại lý kinh doanh thuốc BVTV chỉ cung ứng các loại thuốc có trong danh mục và theo hướng dẫn của Chi cục Trồng trọt & BVTV. /.

**Nơi nhận:**

- Đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh PTK;
  - Văn phòng UBND tỉnh;
  - Cục BVTV, TT&BVTV phía Bắc;
  - Các đ/c lãnh đạo Sở NN&PTNT;
  - Một số đơn vị có liên quan;
  - Như kính gửi;
  - Đài PTTH tỉnh, Báo Nam Định;
  - Website Sở Nông nghiệp & PTNT;
  - Lưu VT, TT&BVTV.
- } (để báo cáo)

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Đỗ Hải Điền**