

## CÔNG ĐIỆN

Số: 02/CD-SNNPTNT; ngày 04 tháng 5 năm 2019

### SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT NAM ĐỊNH ĐIỆN

#### UBND, Phòng Nông nghiệp & PTNT các huyện, thành phố

Theo báo cáo của Chi cục Trồng trọt và BVTV và kiểm tra thực tế đồng ruộng cho thấy: Đến nay, diện tích lúa Xuân đã trổ 40.330 ha (54% diện tích), dự kiến đến ngày 10/5 có 86% diện tích lúa trổ, đến ngày 15/5 100% diện tích lúa Xuân toàn tỉnh cơ bản trổ xong.

Thời gian qua các huyện, thành phố đã tích cực hướng dẫn nông dân phòng trừ các đối tượng sâu bệnh. Tuy nhiên trong đợt phòng trừ, thời tiết không thuận lợi, có mưa nhiều ngày, nhiều diện tích phun xong gặp mưa nên hiệu quả phòng trừ kém. Trong những ngày tới còn có mưa kèm theo giông gió, nền nhiệt độ có xu hướng giảm, trời âm u, thiếu ánh sáng, ẩm độ cao; Đây là điều kiện rất thuận lợi cho bệnh đạo ôn cổ bông và các đối tượng dịch hại khác phát sinh và gây hại mạnh, có nguy cơ bùng phát gây hại trên diện rộng làm giảm sút nghiêm trọng năng suất lúa Xuân.

Ngoài ra rầy nâu lúa 3 sẽ nở rộ từ sau ngày 12/5 với quy mô phân bố và mức độ gây hại cao hơn vụ Xuân 2018; các đối tượng khác như: sâu cuốn lá nhỏ, bệnh khô vằn, bệnh đen lép hạt tiếp tục phát sinh gây hại mạnh từ nay đến cuối vụ.

Trước tình hình trên, Sở Nông nghiệp & PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Nông nghiệp & PTNT, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp các huyện, thành phố và Ban Nông nghiệp các xã/thị trấn tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các hộ nông dân tự kiểm tra đồng ruộng, phát hiện kịp thời các đối tượng sâu bệnh để phòng trừ theo nguyên tắc “4 đúng”.

2. Tranh thủ thời tiết thuận lợi khẩn trương phun thuốc phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông cho những diện tích lúa phun xong gặp mưa, lúa đang trổ và khi lúa bắt đầu trổ 3-5% số bông, tập trung trên các giống nhiễm như: Dự Hương, X21, BC15, Khang Dân 18, Q5, QR1, Nếp, Thiên ưu 8... đặc biệt là những diện đã nhiễm bệnh đạo ôn lá và khi lúa trổ gặp mưa.

Sử dụng thuốc có hoạt chất Tricyclazole (*Beam 75WP, Kabim 30WP, Kasai-S 92SC, Folia 525SE, Bamy 75WP...*); hoạt chất khác (*Nativo 750WG, Bumrosai 650WP...*)...Không sử dụng các loại thuốc chỉ chứa 1 hoạt chất Isoprothiolane để phun phòng bệnh đạo ôn cổ bông do hiệu quả phòng trừ rất thấp.

Theo dõi để phun trừ kịp thời sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu lúa 3 (từ sau ngày 12/5), bệnh khô vằn và đen lép hạt theo hướng dẫn của cơ quan chuyên ngành.

3. Phân công cán bộ bám sát cơ sở; tổ chức các đoàn liên ngành tăng cường kiểm tra các cửa hàng, đại lý kinh doanh thuốc BVTV; phát hiện kịp thời và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

4. Thường xuyên theo dõi diễn biến sâu bệnh trên đồng ruộng, báo cáo kết quả phòng trừ về Sở Nông nghiệp và PTNT thông qua Chi cục Trồng trọt và BVTV. /.

**Nơi nhận:**

- Đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh PTK;
  - Văn phòng UBND tỉnh;
  - Cục TT, Cục BVTV;
  - Các đ/c lãnh đạo Sở;
  - Trung tâm BVTV phía Bắc;
  - UBND, Phòng NN-PTNT,
  - Trung tâm DV NN các huyện, TP
  - Một số đơn vị có liên quan;
  - Website Sở Nông nghiệp & PTNT;
  - Lưu: VT, TT&BVTV
- } (để B/c)



**GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Doãn Lâm**