

Số: /SYT-NVY
V/v tuyên truyền, quản lý đối với việc
sản xuất, kinh doanh và sử dụng rượu

Hải Phòng, ngày tháng năm 2025

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu;
- Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm;
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật;
- Trung tâm Y tế khu vực;

Vào dịp cuối năm, nhu cầu sử dụng rượu bia thường tăng mạnh do người dân tập trung tổ chức các buổi lễ cưới hỏi, đám giỗ hay tiệc gia đình, gặp gỡ bạn bè. Tuy nhiên, thời gian qua đã ghi nhận nhiều trường hợp ngộ độc nghiêm trọng do sử dụng rượu kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và tính mạng.

Nhằm giảm thiểu các tai biến do rượu bia trong mùa cao điểm, Sở Y tế đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu, các cơ quan, đơn vị quyết liệt thực hiện các nội dung sau để đảm bảo an toàn cho người dân:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến cáo người dân:

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về tác dụng không tốt từ việc sử dụng rượu/bia, đặc biệt là các sản phẩm rượu không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, rượu pha chế từ cồn công nghiệp. Khuyến cáo người dân chỉ mua, sử dụng rượu có nguồn gốc rõ ràng (có nhãn mác, giấy kiểm định chất lượng) và tuyệt đối không mua bán, sử dụng cồn công nghiệp để pha chế rượu (*tài liệu tuyên truyền tham khảo gửi kèm theo*).

2. Kiểm tra, giám sát sản xuất, kinh doanh:

Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất và kinh doanh rượu trên địa bàn. Đặc biệt chú trọng các cơ sở chưng cất thủ công, sản xuất rượu tại gia, cũng như các điểm bán hàng rong, chợ tạm có kinh doanh rượu không rõ nguồn gốc, các sản phẩm rượu chưa được công bố chất lượng với cơ quan quản lý nhà nước. Đối với những sản phẩm nghi ngờ, cần lấy mẫu thử nghiệm nhanh Methanol hoặc gửi mẫu xét nghiệm tại các phòng xét nghiệm có thẩm quyền. Đánh giá chất lượng các sản phẩm rượu thông qua xét nghiệm nhanh (bộ test Methanol) hoặc lấy mẫu rượu gửi các đơn vị kiểm nghiệm để đánh giá chất lượng. Thực hiện truy xuất nguồn gốc đối với các sản phẩm không đạt yêu cầu.

3. Xử lý nghiêm vi phạm:

Phối hợp với lực lượng chức năng (Quản lý thị trường, Công an, Thanh tra...) kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (nhà hàng, quán bar,

karaoke, tiệc cưới...). Nếu phát hiện sử dụng, kinh doanh rượu kém chất lượng hoặc không rõ nguồn gốc, xử lý nghiêm theo quy định. Thực hiện truy xuất nguồn gốc để có biện pháp xử lý cuối cùng đối với sản phẩm vi phạm.

4. Tổ chức tuyên truyền tại cơ sở:

Lồng ghép nội dung phòng chống tác hại của rượu (đặc biệt rượu không rõ nguồn gốc) trong các buổi họp dân, sinh hoạt cộng đồng và hội nghị tại thôn, tổ dân phố. Phát huy vai trò của hệ thống y tế cơ sở, công tác viên dân số, tổ trưởng dân phố trong việc tuyên truyền trực tiếp đến từng hộ dân. Đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh xã, phường để đảm bảo thông tin đến mọi người dân, nhất là ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Sở Y tế đề nghị các đơn vị phối hợp triển khai thực hiện các nội dung trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- GD SYT (để b/c);
- Lưu: VT, NVY.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Phan Huy Thục

NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

(Gửi kèm theo Công văn số /SYT-NVY ngày /12/2025 của Sở Y tế)

I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM

“Sản phẩm rượu” là đồ uống có cồn thực phẩm. Sản phẩm rượu được sản xuất từ quá trình lên men (có hoặc không chưng cất) từ tinh bột của các loại ngũ cốc, dịch đường của cây và hoa quả hoặc được pha chế từ cồn thực phẩm (Ethanol).

“Cồn thực phẩm” là hợp chất hữu cơ có công thức phân tử là C_2H_5OH và có tên khoa học theo danh pháp quốc tế IUPAC là Ethanol, đạt tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Ngộ độc rượu là do lạm dụng rượu hoặc sử dụng rượu không bảo đảm an toàn thực phẩm (sử dụng rượu được sản xuất từ phương pháp lên men thủ công dễ tạo ra methanol, rượu pha chế từ cồn công nghiệp có chứa methanol hoặc cồn Methanol, rượu ngâm thuốc, rượu ngâm cây rừng độc, rượu ngâm phủ tạng động vật....)

II. PHÂN LOẠI VÀ XỬ TRÍ NGỘ ĐỘC RƯỢU:

Thường gặp hai loại ngộ độc rượu chính là ngộ độc rượu Etylic (Ethanol) và ngộ độc rượu Metylic (Methanol).

Bao gồm có ngộ độc cấp tính hoặc mạn tính, phụ thuộc vào số lượng rượu uống và tần suất, thời gian uống rượu. Thông thường, hàm lượng rượu trong máu từ 1-1,5 g/lít có thể gây “say” và 4-6 g/lít có thể gây tử vong.

Ngộ độc rượu cấp tính: Giai đoạn đầu có biểu hiện nói nhiều, mất điều hòa vận động phối hợp, giảm khả năng kiểm soát, kích động. Giai đoạn sau có phản xạ gân xương giảm, tri giác giảm, mất khả năng tập trung tư tưởng, rãn mạch ngoại vi. Hơi thở của bệnh nhân có mùi rượu, buồn nôn, nôn đau bụng; khó thực hiện các động tác đơn giản; nói líu; đi lảo đảo; biểu hiện lơ mơ, nhìn mờ, lơ òng; có khi co giật, mất ý thức, hạ huyết áp...

Ngộ độc rượu mạn tính: do uống rượu kéo dài, dẫn đến sút cân; chán ăn; tiêu chảy do tổn thương gan và ruột; da niêm mạc nhợt do thiếu máu; xơ gan; ung thư.

Methanol được dùng trong công nghiệp hóa chất, ngộ độc methanol xảy ra khi uống nhầm Methanol hoặc uống rượu có chứa Methanol. Methanol rất độc vì chúng thải trừ chậm, ô xy hóa thành Formol (Formaldehyd) và axit Formic. Chỉ cần uống 5-15ml có thể gây ngộ độc nặng, 15ml trở lên gây mù lòa, 30 ml có thể gây tử vong. Độc tính của Methanol bao gồm tác dụng ức chế hệ thống thần kinh trung ương; ảnh hưởng tới thần kinh mắt...

Trường hợp ngộ độc Methanol nhẹ có biểu hiện cảm giác say say, chóng mặt; buồn nôn, nôn ói; nhức đầu. Trường hợp nặng sẽ có biểu hiện rối loạn tiêu hóa, nôn ra máu, rối loạn thần kinh (co giật, hôn mê, co cứng toàn thân); rối loạn

hô hấp (*thở nhanh, phù phổi cấp*); rối loạn tuần hoàn (*mạch nhanh, huyết áp giảm*); đồng tử giãn, xuất tiết võng mạc và tử vong.

- Xử trí ngộ độc rượu Etylic (*Ethanol*):

+ Say rượu: cho bệnh nhân nằm nghỉ nơi yên tĩnh; có thể cho uống 10-20 giọt Amoniac hay 1-5g Amonium acetat trong một cốc nước muối.

+ Ngộ độc rượu: Nếu bệnh nhân mất ý thức hoặc lơ mơ hoặc có biểu hiện ngừng thở hoặc hôn mê, có giật cần đưa ngay đến cơ sở điều trị gần nhất để được cấp cứu và điều trị kịp thời.

- Xử trí ngộ độc rượu Metylic (*Methanol*): Đưa ngay bệnh nhân đến cơ sở điều trị gần nhất để được hồi sức cấp cứu và điều trị kịp thời.

III. PHÒNG CHỐNG NGỘ ĐỘC RƯỢU:

- Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu:

+ Rượu thuộc nhóm hàng hóa nhà nước hạn chế kinh doanh. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm rượu (*phân phối, bán buôn, bán lẻ*) phải có giấy phép và tuân thủ các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh rượu.

+ Không sản xuất, kinh doanh rượu không đảm bảo an toàn thực phẩm: rượu pha chế từ cồn công nghiệp chứa methanol, rượu pha chế từ nguyên liệu không bảo đảm chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ và nhãn mác.

- Đối với người tiêu dùng:

+ Phụ nữ mang thai uống nhiều rượu có thể gây sinh non, ảnh hưởng đến phát triển thể chất, tinh thần, trí tuệ của đứa trẻ, gây ngộ độc cho thai nhi.

+ Không uống cồn công nghiệp và rượu có hàm lượng methanol > 0,1% vì có thể gây mù mắt và tử vong.

+ Không uống rượu nồng độ từ 30 độ trở lên vượt quá 30ml/người/ngày.

+ Không uống rượu ngâm với lá, rễ cây, phủ tạng động vật không rõ độc tính hay rượu ngâm theo kinh nghiệm cá nhân.

+ Không uống rượu khi: Không biết đó là rượu gì, rượu không có nguồn gốc, rượu không công bố tiêu chuẩn chất lượng, khi đang đói, mệt hoặc đang uống thuốc điều trị.

+ Trẻ em dưới 16 tuổi không được uống rượu/ bia.

+ Một người bình thường không nên uống quá 1 đơn vị rượu/ngày (*1 đơn vị rượu chứa 10g cồn*), tương đương:

* 30ml rượu mạnh (40-43 độ);

* 100ml rượu vang (13,5 độ);

* 330ml bia hơi (5 độ);

* 2/3 chai 500ml hoặc lon bia 330ml (5 độ).

