

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1794/SYT-NVD

Hải Phòng, ngày 18 tháng 7 năm 2018

V/v cập nhật thông tin hướng dẫn sử dụng đối
với thuốc chứa cefmetazol đường tiêm tĩnh
mạch, tiêm truyền tĩnh mạch

Kính gửi:

- Các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn;
- Các cơ sở kinh doanh dược.

Thực hiện Công văn số 13398/QLD-ĐK ngày 13/7/2018 của Cục Quản lý
Dược - Bộ Y tế về việc cập nhật thông tin hướng dẫn sử dụng đối với thuốc
chứa cefmetazol đường tiêm tĩnh mạch, tiêm truyền tĩnh mạch; để đảm bảo mục
tiêu sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả, Sở Y tế Hải Phòng yêu cầu:

1. Giám đốc các đơn vị thông báo, chỉ đạo đơn vị mình cập nhật thông tin
hướng dẫn sử dụng đối với thuốc chứa cefmetazol đường tiêm tĩnh mạch, tiêm
truyền tĩnh mạch theo Phụ lục đính kèm Công văn này. Việc kê đơn, sử dụng
thuốc phải tuân thủ hoàn toàn theo chỉ định, liều dùng và cách dùng đã cập nhật
theo Công văn này sau 06 tháng kể từ ngày 13/7/2018. Đồng thời tăng cường
thực hiện việc theo dõi tác dụng không mong muốn của thuốc trong quá trình sử
dụng và lưu hành; gửi báo cáo ADR (nếu có) về: Trung tâm quốc gia về Thông
tin thuốc và Theo dõi phản ứng có hại của thuốc (13-15 Lê Thánh Tông, Quận
Hoàn Kiếm, Hà Nội)

2. Giao Thanh tra Sở Y tế phối hợp với Phòng Nghiệp vụ Dược, Phòng
Nghiệp vụ Y, Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm, Phòng Y
tế quận, huyện kiểm tra, giám sát các cơ sở khám, chữa bệnh, đơn vị sản xuất,
kinh doanh thuốc chứa cefmetazol đường tiêm tĩnh mạch, tiêm truyền tĩnh mạch,
đặc biệt là các doanh nghiệp cung ứng thầu cho bệnh viện thực hiện Thông báo
này để đảm bảo việc kê đơn, sử dụng thuốc phải tuân thủ hoàn toàn theo chỉ
định, liều dùng và cách dùng đã cập nhật theo Công văn này sau 06 tháng kể từ
ngày 13/7/2018.

Sở Y tế thông báo để đơn vị biết và thực hiện./. ✓

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc SYT; (để báo cáo)
- PGĐ Nguyễn Tiến Sơn;
- NVY;
- VP; (để đăng tải lên Cổng TTĐT SYT)
- Lưu: VT, NVD.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
SỞ Y TẾ

Nguyễn Tiến Sơn

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



PHỤ LỤC

Các nội dung thay đổi/bổ sung đối với thuốc chứa cefmetazol đường tiêm tĩnh mạch, tiêm truyền tĩnh mạch

(Đính kèm Công văn số 1794 /SYT-NVD ngày 18 /7/2018 của Sở Y tế)

[Đối với tất cả các thuốc chứa cefmetazol đường tiêm tĩnh mạch, tiêm truyền tĩnh mạch, thông tin trên nhãn thuốc và tờ hướng dẫn sử dụng yêu cầu thay đổi nội dung các mục Chỉ định, Liều dùng và cách dùng theo đúng các thông tin được cung cấp dưới đây]

1. Chỉ định

Cefmetazol được chỉ định cho các nhiễm khuẩn do các vi khuẩn còn nhạy cảm với thuốc như: Nhiễm khuẩn thứ phát của viêm bàng quang, viêm thận, bể thận, viêm phúc mạc, viêm túi mật, viêm đường mật, viêm tuyến Bartholin và phần phụ, nhiễm khuẩn tử cung, viêm kết mạc, viêm mô quanh xương hàm, viêm xương hàm.

2. Liều dùng và cách dùng:

2.1. Liều dùng:

Đối với người lớn, tiêm tĩnh mạch hoặc truyền nhỏ giọt tĩnh mạch liều 1 đến 2 g mỗi ngày, chia làm hai lần.

Với trẻ nhỏ, liều thông thường hàng ngày 25-100 mg/kg, tiêm tĩnh mạch hoặc tiêm truyền nhỏ giọt tĩnh mạch, chia làm 2 đến 4 lần.

Tuy nhiên, tùy thuộc vào tình trạng nhiễm khuẩn dai dẳng hoặc nặng, tăng lên 4g cho người lớn, 150 mg /kg ở trẻ em mỗi ngày, chia làm 2 đến 4 lần.

2.2. Cách dùng:

Hòa tan vào 10ml nước cất hoặc dung dịch Natri clorid 0,9% hoặc dung dịch glucose đẳng trương, tiêm tĩnh mạch chậm.

Ngoài ra, thuốc này cũng có thể được dùng truyền nhỏ giọt tĩnh mạch. Mỗi 1 g khi cho truyền nhỏ giọt tĩnh mạch nên được hòa tan từ từ trong dung dịch Natri clorid 0,9% khi sử dụng. Truyền nhỏ giọt tĩnh mạch bắt buộc phải pha thuốc trong dung dịch đẳng trương./.