

Sơn La, ngày 12 tháng 03 năm 2025

BẢN THÔNG TIN THUỐC

Tổ Dược lâm sàng – Thông tin thuốc xin thông tin đến các cán bộ y tế thông tin thuốc sau:

THUỐC NEUROPYL 800

1. Hoạt chất: Piracetam 800mg

2. Chỉ định:

- Đơn trị liệu hoặc phối hợp trong chứng rung giật cơ có nguồn gốc từ vỏ não; thiếu máu não; suy giảm nhận thức ở người già; chóng mặt
- Điều trị chứng khó đọc ở trẻ em, kết hợp với các liệu pháp dạy nói.

3. Chống chỉ định

- Mẫn cảm với các thành phần của thuốc
- Người bị bệnh suy gan, thận nặng; xuất huyết não; người mắc chứng múa giật Huntington (rối loạn về mặt vận động, tâm lý hoặc nhận thức)

4. Cách dùng - Liều dùng: Dùng đường uống, có thể cùng hoặc không cùng với thức ăn và nên uống nguyên viên thuốc với một lượng nước

- Điều trị rung giật cơ có nguồn gốc từ vỏ não:

Dùng liều khởi đầu 7,2g (9viên)/ngày/2-3lần- tối đa 24g (30viên)/ngày/2-3lần

- Điều trị thiếu máu não; suy giảm nhận thức ở người già; chóng mặt:

Dùng liều từ 2,4g - 4,8g(3-6viên)/ngày/2-3 lần

- Điều trị chứng khó đọc ở trẻ em từ 8-13 tuổi: Liều 3,2g (4viên)/ngày/2lần.

Uống trước bữa ăn và uống duy trì thường xuyên suốt năm học

- Điều trị người cao tuổi có tổn thương chức năng gan, thận: Cần đánh giá độ thanh thải

5. Tác dụng không mong muốn

❖ *Thường gặp:* Bồn chồn, tăng động

❖ *Ít gặp:* Trầm cảm, buồn ngủ, suy nhược

6. Tương tác thuốc

+ Kết hợp Piracetam với tinh chất tuyền giáp: gây lú lẫn, bị kích thích và rối loạn giấc ngủ

+ Piracetam kết hợp với Warfarin = Xét nghiệm Prothrombin ↑

7. Cảnh báo và thận trọng khi sử dụng thuốc

- Piracetam được thải trừ qua thận nên thận trọng khi dùng thuốc (đặc biệt người cao tuổi) cho bệnh suy thận. Cần theo dõi chức năng thận

- Tránh ngừng thuốc đột ngột ở bệnh nhân rung giật cơ do nguy cơ gây co giật

- Piracetam có tác động trên quá trình kết tập tiểu cầu, nên thận trọng khi dùng thuốc cho bệnh nhân bị bệnh xuất huyết nặng, bệnh nhân có nguy cơ chảy máu (Loét đường tiêu hóa, rối loạn cầm máu, tiền sử tai biến mạch máu não), bệnh nhân đang dùng thuốc chống đông máu hoặc thuốc chống tập kết tiểu cầu

- Piracetam có thể gây phản ứng dị ứng do có chứa chất màu sunset yellow

8. Quá liều và cách xử trí

Triệu chứng: Không có tác dụng ngoại ý khi dùng quá liều Piracetam. Có trường hợp đã được báo cáo với các triệu chứng: Tiêu chảy ra máu kèm đau bụng có thể do lượng Sorbitol có trong công thức quá cao.

Xử trí: Quá liều cấp tính, làm rỗng dạ dày hoặc gây nôn. Không có giải độc đặc hiệu, chủ yếu điều trị triệu chứng, có thể thẩm tách máu.

NGƯỜI THÔNG TIN



Và A Sá

BỘ PHẬN DƯỢC



Nguyễn Thị Hồng
Nhung

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Liễu