BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂN CHÂU **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TỔ THÔNG TIN THUỐC **Độc lập- Tự do- Hạnh phúc**

Tân Châu, ngày 04 tháng 02 năm 2026

THÔNG TIN THUỐC THÁNG 02 NĂM 2026

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC KETOTIFEN (KETOTIFEN DWP)

1- **Hoạt chất**: Ketotifen 1 mg

2- Chỉ định:

- Điều trị hen phế quản, viêm mũi dị ứng, viêm da, mẩn ngứa, viêm kết mạc dị ứng.

- Lưu ý: Ketotifen không được chỉ định để điều trị cơn hen cấp tính.

3- Liều dùng- cách dùng.

- Cách dùng: thuốc dùng đường uống.

- Liều dùng:

+ Người lớn, thanh thiếu niên và trẻ em trên 6 tuổi.

Liều dùng thường là 1 mg x 2 lần/ ngày, sau khi ăn sáng và trước khi đi ngủ.

Dạng viên nang không thích hợp cho trẻ em dưới 6 tuổi. Ở trẻ em từ 4 đến 6 tuổi, nên sử dụng dạng dung dịch uống.

Do nguy cơ buồn ngủ khi bắt đầu điều trị, chỉ nên dùng ½ liều vào buổi tối trong vài ngày đầu để cơ thể có thời gian thích nghi.

+ Các đối tượng đặc biệt.

Người cao tuổi(65 tuổi trở lên)

Không cần điều chỉnh liều ở người cao tuổi.

Bệnh nhân suy thận: chưa có nghiên cứu ở bệnh nhân suy thận. Do Ketotifen được thải trừ qua nước tiểu (60-70%), nên trách sử dụng Ketotifen ở bệnh nhân suy thận.

Bệnh suy gan: chưa có nghiên cứu ở bệnh nhân suy gan. Do Ketotifen được chuyển hóa ở gan, nên tránh sử dụng Ketotifen ở bệnh nhân suy gan nặng.

4- Chống chỉ định:

- Quá mẫn vơi bất kỳ thành phần nào của thuốc.

- Tiền sử động kinh hoặc co giật.

- Kết hợp với thuốc điều trị đái tháo đường dạng uống.

- Phụ nữ cho con bú.

5- Tương tác thuốc:

- Kết hợp bị chống chỉ định: Thuốc điều trị đái tháo đường dạng uống, do nguy cơ giảm tiểu cầu (các biguanid).

- Kết hợp không được khuyến cáo: rượu làm tăng tác dụng an thần. Giảm khả năng tỉnh táo có thể khiến việc lái xe và vận hành máy móc trở nên nguy hiểm. Tránh dùng đồ uống có cồn và thuốc có chứa cồn.

- Kết hợp cần thận trọng:

Thuốc có tác dụng giống atropin.

Thuốc có tác dụng giống atropin có thể gây ra các tác dụng không mong muốn và dễ gây bí tiểu, khởi phát đợt cấp của tăng nhãn áp, táo bón, khô miệng…

Đại diện cho các thuốc có tác dụng giống atropin bao gồm thuốc chống trầm cảm nhóm imipramin, hầu hết các thuốc kháng histamin H1 kiểu atropin, thuốc điều trị Parkinson kháng cholinergic, thuốc chống co thắt atropin, disopyramind, thuốc an thần kinh nhóm phenothiazin cũng như Clozapin.

- Thuốc an thần: tăng tác dụng ức chế hệ thần kinh trung ương khi dùng Ketotifen cùng với các dẫn xuất của Morphin(thuốc giảm đau, thuốc giảm ho), thuốc an thần kinh, các barbiturat, các benzodiazepin, thuốc an không phải benzodiazepin(ví dụ meprobamat), thuốc gây ngủ, thuốc chống trầm cảm, thuốc kháng histamin H1 có tác dụng an thần, thuốc điều trị tăng huyết áp tác động thần kinh trung ương, baclofen và thalidomid.

6- Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc:

- Sự xuất hiện của bội nhiễm ở phế quản hoặc tai mũi họng đòi hỏi phải sử dụng thêm các liệu pháp chống nhiễm khuẩn đặc hiệu.

- Các trường hợp co giật rất hiếm khi được báo cáo, đặc biệt là ở trẻ em, trong khi điều trị bằng Ketotifen. Chống chỉ định dùng Ketotifen ở bệnh nhân có tiền sử động kinh hoặc co giật.

- Không khuyến cáo dùng Ketotifen cùng với rượu hoặc các thuốc có chứa cồn.

- Sử dụng đồng thời Ketotifen với thuốc điều trị đái tháo đường dạng uống(các biguanid) có nguy cơ làm giảm tiểu cầu. Chống chỉ định dùng đồng thời Ketotifen với các thuốc này. Nên giảm liều trong trường họp bệnh nhân bị rối loạn tâp trung do tác dụng an thần của Ketotifen gây ra.

- Không khuyến cáo dùng Ketotifen ở trẻ sơ sinh và trẻ em dưới 4 tuổi. Việc sử dụng đồ uống có cồn trong quá trình điều trị không được khuyến cáo.

7- Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú.

- Phụ nữ có thai: chưa có đủ dữ liệu để đánh giá khả năng gây dị tật hoặc gây độc cho thai nhi của Ketotifen khi dùng trong thời kỳ mang thai. Để thận trọng, không nên sử dụng Ketotifen trong thời kỳ mang thai.

- Phụ nữ cho con bú: Ketotifen được bài tiết qua sữa của chuột đang cho con bú. Do chưa có dữ liệu trên người, chống chỉ định dùng Ketotifen trong thời kỳ cho con bú.

- Khả năng sinh sản: giảm khả năng sinh sản ở chuột đực. Hiện chưa có dữ liệu về ảnh hưởng của Ketotifen đối với khả năng sinh sản ở người.

8- Ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc.

- Ketotifen có thể gây buồn ngủ, do vậy cần đặc biệt lưu ý khi người bệnh tham gia lái xe, vận hành máy móc.

- Tài liệu tham khảo: tờ hướng dẫn sử dụng KETOTIFEN DWP của công ty dược phẩm WEALPHAR.