

THÔNG TIN THUỐC THÁNG 03 NĂM 2025

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC DIOSMIN 600 MG (PHLEBODIA)

1. **Hoạt chất:** Diosmin 600 mg.

2. **Chỉ định:**

- Hỗ trợ điều trị các triệu chứng có liên quan đến suy tuần hoàn tĩnh mạch mạn tính (nặng chân, đau, cảm giác bứt rứt).

- Điều trị hỗ trợ chứng dễ vỡ mạch máu.
- Điều trị các dấu hiệu có liên quan đến con trĩ cấp.

3. **Liều dùng- cách dùng.**

- Suy tĩnh mạch: 1 viên mỗi ngày, uống trong bữa ăn.
- Trĩ cấp tính: 2-3 viên/ ngày, uống trong bữa ăn.
- Đường dùng: uống, nuốt cả viên thuốc với một cốc nước.

4. **Chống chỉ định:**

- Dị ứng với một trong các thành phần của thuốc.
- Bà mẹ đang cho con bú.

5. **Tương tác thuốc, tương kỵ của thuốc:**

- Để tránh tương tác có thể xảy ra giữa các loạn thuốc, phải báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ tất cả các thuốc đang điều trị khác.

6. **Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú.**

- Không có hoặc có ít dữ liệu về việc phụ nữ có thai sử dụng Diosmin.
- Các nghiên cứu trên động vật không thấy tác hại trực tiếp hoặc gián tiếp với giai đoạn sinh sản. như một biện pháp phòng ngừa, nên tránh sử dụng thuốc trong thai kỳ.
- Do thiếu các dữ liệu liên quan đến sự bài tiết sữa, nên cân nhắc lợi ích và nguy cơ giữa việc điều trị với Phlebodia và nuôi con bằng sữa mẹ.

7. 8. **Tác động trên khả năng lái xe và vận hành máy móc.**

- Chưa có dữ liệu nghiên cứu về ảnh hưởng của thuốc đến khả năng lái xe và vận hành máy móc

Tài liệu tham khảo: tờ hướng dẫn sử dụng PHLEBODIA của công ty INNOTHERA CHOUZY.